

СЛАВОМИР ПОНОВИЋ

ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА БИКОПНИЦОМ

• ПЧЕЛАРСКИ ПРИРУЧНИК •



Београд, 1999.

СЛАВОМИР ПОПОВИЋ

ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА ЈПР-КОШНИЦОМ

- ПЧЕЛАРСКИ ПРИРУЧНИК -

Београд, 1999.

Аутор и издавач:
Др Славомир Поповић, дипл. инж.

**Технологија пчеларења ЛР-кошницом
- пчеларски приручник -**

Уредник:
Небојша Миленовић

Рецензент:
Божа Петровић

Технички уредник:
Јулијана Ноздрин

Штампа:
Завод за графичку технику ТМФ, Београд

Тираж: 300

СИР - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

638.1

ПОПОВИЋ, Славомир
Технологија пчеларења ЛР-кошницом /
Славомир Поповић. - Београд : С. Поповић,
1999 (Београд : Завод за графичку технику
Технолошко-металуршког факултета). -102 стр.
. илустр ; 21 см

а) Пчеларство
Ид=72604428

Пчелари-почетници јо ћправилу на почетику свог самосталног пчеларења користећи технологију својих учитеља. Међутим, врло брзо већина будућих ћправих пчелара, нарочито они млађи, осећаје потребу да експерименишу, да покушају да превазиђу своје учитеље. Ова књига је ћре свега њима намењена. Жела је аутора да прикаже највредније примере технологије пчеларења ЛР-кошницом и да исповремено укаже да савремено пчеларење подразумева пчеларење којим се посматрују високи приноси меда. Такво пчеларење подразумева пчеларење са више машица и овладавање техником узгоја машица на самом пчелињаку.

С обзиром да су у овој књизи приказане различите технологије пчеларења ЛР-кошницом, ова књига је намењена и свим пчеларима који испражују и усавршавају свој начин пчеларења.

фебруар 1999.

Аутор

САДРЖАЈ

- 1. УВОД**
- 2. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА СА ЈЕДНОМ МАТИЦОМ И ТЕХНОЛОГИЈА ЗАЗИМЉАВАЊА И ПРОЛЕЋНОГ РАЗВОЈА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА**
 - 2.1. Уводне и апомене**
 - 2.2. Технологија зазимљавања пчелињих друштава**

АВГУСТ

- 2.2.1. Преглед пчелињих друштава почетком августа**
- 2.2.2. Контрола минималне количине резервне хране у пчелињем друштву почетком августа**
- 2.2.3. Распоређивање иаставака почетком августа**
- 2.2.4. Обезбеђивање квалитетиог гијазда и срећивање саћа почетком августа**
- 2.2.5. Блокада и деблокада матице у току августа**
- 2.2.6. Обезбеђење квалитетије медне капе**
- 2.2.7. Стимулативно прихрањивање пчелињих друштава у току августа**
- 2.2.8. Замена старе матице**
- 2.2.9. Обезбеђивање вентилације у кошници и заштита пчелињих друштава од високих температура**
- 2.2.10. Контрола здравственог стања пчелињих друштава**
- 2.2.11. Защита пчела од осица и стршљенова**
- 2.2.12. Спречавање грабежи иа пчелињаку и спровођење превентивних мера против грабежи**
- 2.2.13. Чување резервног саћа**
- 2.2.14. Коитрола количине и квалитета резервне хране крајем августа**
- 2.2.15. Детаљан преглед и увид у стање пчелињих друштава крајем августа**
- 2.2.16. Спајање слабијих друштава са јачим крајем августа**
- 2.2.17. Узимљавање резервних матица крајем августа**

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР, ЈАНУАР

-
- 2.7.2. Други начин - разројавање пчелињих друштава применом Пелетовог система
 - 2.8. Припрема пчелињих друштава за сунцокретову пашу
- ЈУЛ**
- 2.8.1. Сеоба пчелињих друштава на сунцокретову пашу
 - 2.8.2. Припрема пчелињих друштава у јулу за зазимљавање
- 3. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА СПАЈАЊЕМ ДВА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА У ЈЕДНО ПРЕД ГЛАВНУ ПАШУ
 - 4. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА КОРИШЋЕЊЕМ НАЛЕТА ПЧЕЛА У ГЛАВНОЈ ПАШИ
 - 4.1. Уводне напомене
 - 4.2. Поступци пчеларења налетом пчела
 - 4.2.1. Пчеларење са два пчелиња друштва током целе године и коришћење налеста пчела једног друштва за појачавање другог друштва у главној паши
 - 4.2.2. Појачавање производног друштва у главној паши налетом пчела из друштва са другог пчелињака
 - 4.2.3. Пчеларење налетом пчела код пчелињих друштава размештених у групама или низу са три и више друштава
 - 5. ДВОМАТИЧНО ПЧЕЛАРЕЊЕ ТОКОМ ЦЕЛОГ ПЕРИОДА ПАШЕ
 - 6. ПОЛУДВОМАТИЧНО ПЧЕЛАРЕЊЕ
 - 7. ПЧЕЛАРЕЊЕ ДВОЈНИМ ДРУШТВИМА
 - 8. КОМБИНОВАНО ПЧЕЛАРЕЊЕ: ДВОМАТИЧНО - ДВОЈНО - ЈЕДНОМАТИЧНО
 - 9. ПЧЕЛАРЕЊЕ СА ТРИ ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА
 - 9.1. Пчеларење са три једноматична друштва током целе године и коришћење налеста пчела два друштва за појачавање трећег - производног друштва у главној паши
 - 9.2. Пчеларење двојним и једноматичним друштвом до главне паше, а у главној паши формирање јаког двојног друштва
 - 9.3. Пчеларење са три друштва током целе године под истим кровом, а у главној паши формирање јаког двојног друштва спајањем
 - 10. ЛИТЕРАТУРА



Компанија ПБК "Велепродажа" - Продукт

"АГРОМЕД"

Нови Београд
Тошић булевар 161
Тел. (011) 696-919, 603-374, 601-468

ВРШИ ОТКУП МЕДА, ПОЛЕНА, ПРОПОЛИСА И ВОСКА
ПРОИЗВОДИ ДРЕКО 30 ВРСТА ПЧЕЛИНИХ ПРЕПАРАТА
ПАКУЈЕ МЕД У ТЕГЛЕ И У ПЛАСТИЧНЕ ФОЛИЈЕ (ОД 20 g ДО 1 kg)
ЗА УГОСТИЋЕСТВО, ЗДРАВСТВО И ДРУГЕ ПОТРОШАЧЕ
ПАКУЈЕ МЕД У ТУБИЦЕ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОПРЕМУ, АЛАТ И ПРИБОР ЗА ПЧЕЛАРСТВО
ПРОИЗВОДИ САТНЕ ОСНОВЕ ИСКЉУЧИВО ОД ЧИСТОГ ВОСКА
(БЕЗ ПАРАФИНА)
**СПРЕМНИ СМО ЗА САРАДЊУ СА ПЧЕЛАРИМА И ПРОИЗВОЂАЧИМА
ОПРЕМЕ И ПРИБОРА**

**ПЧЕЛАРИ, САРАЂУЈТЕ СА НАМА:
МИ ВАМА НАШЕ ПРОИЗВОДЕ - ВИ НАМА ВАШЕ ПРОИЗВОДЕ**

1. УВОД

Да би се обезбедила јака пчелиња друштва, са што већим бројем сабирачица и са екладним односом између сабирачица, неговатељица и легла, и да би се остварили високи приноси меда, постоје две могућности:

прва, да се савременим методама и селекцијом одабере и однегује квалитетна матица, или,

друга, да се формирају снажна друштва помоћу две или више матица, користећи различите технологије пчеларења с тим у вези.

Практично, за већину пчелара поступак селекције квалитетних матица не долази у обзир, јер је то изузетно сложен и стручан посао. Међутим, поступак пчеларења са две или са више матица могу да примене скоро сви пчелари.

Када се пчелар одлучује коју ће технологију пчеларења да примени, треба да има у виду и следеће констатације, које су дате на основу сличних података у часопису Пчелар (6/97, стр. 165-172), уз претпоставку да 10.000 пчела сабирачица сакупи 1 kg меда и да је потрошња хране на сваких 40 dm^2 легла 1 kg:

- Да би пчелиње друштво остварило што веће приносе меда у главној паши, важно је не само да у пчелињем друштву има што већи број пчела (60.000-65.000), већ да је однос пчела сабирачица и пчела неговатељица што већи у корист пчела сабирачица. То практично значи, што је мање отвореног легла у главној паши, то ће мање пчела неговатељица бити ангажовано неговањем легла, а већи број пчела ангажоваће се на сакупљању нектара, па ће и приноси меда бити већи (таблица 1.1.)^{*)}.

Таблица 1.1. Однос броја пчела сабирачица и неговатељица у зависности од величине легла^{**)}

| Основне карактеристике друштва | друштво А | друштво Б |
|--|-----------|-----------|
| Укупан број пчела у друштву | 40.000 | 40.000 |
| Величина отвореног легла (dm^2) | 40 | 20 |
| Број пчела неговатељица | 20.000 | 10.000 |
| Број пчела сабирачица | 20.000 | 30.000 |
| Укупно сакупљени мед (kg) | 2 | 3 |
| Потрошња (kg) | 1 | 0,5 |
| Мед за врџање (kg) | 1 | 2,5 |

^{*)} Што је мање легла у багремовој паши, то је мање пчела у наредној паши, а та околност не одговара нарочито селекционим пчеларима.

^{**)} Подаци наведени у свим таблицама у овој књизи дати су на основу података у часопису "Пчелар", 6/97, стр. 165-172.

- Пчелару не треба да буде циљ да у главној (багремовој) паши буде што мање легла. Напротив, пчелар треба да примени такву технологију пчеларења да и у главној паши матица положе јаја колико јој могућности то дозвољавају, дакле што је могуће више, са једне стране, а са друге стране, да се остваре истовремено што већи приноси меда. То значи, треба да се повећа број сабирачица у главној паши у односу на број неговатељица, али да се величина легла не смањује (таблица 1.2.).

Таблица 1.2. Утицај броја сабирачица на принос меда

| Основне карактеристике друштва | друштво А | друштво Б |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Укупан број пчела | 40.000 | 60.000 |
| Величина легла (dm^2) | 40 | 40 |
| Број пчела неговатељица | 20.000 | 20.000 |
| Број пчела сабирачица | 20.000 | 40.000 |
| Укупно сакупљени мед (kg) | 2 | 4 |
| Погрошња меда (kg) | 1 | 1 |
| Мед за врџање (kg) | 1 | 3 |

Када се ради о примени одређене технологије пчеларења ради добијања јаких друштава у главној паши, са 60-65 хиљада пчела, могућности су различите. С тим у вези, у овој књизи детаљније ће бити обраћене следеће технологије пчеларења:

- Технологија пчеларења са једном матицом и технологија зазимљавања и пролећног развоја пчелињих друштава;
- Технологија пчеларења спајањем два друштва у једно пред главну пашу;
- Технологија пчеларења коришћењем налета пчела у главној паши;
- Двоматично пчеларење током целог периода паше;
- Полудвоматично пчеларење;
- Пчеларење двојним друштвима;
- Комбиновано пчеларење: двоматично-двојно-једноматично;
- Пчеларење са три пчелиња друштва.

Наравно, у зависности од услова пчеларења и искуства пчелара, могуће су различите комбинације наведених технологија пчеларења.

У оквиру технологије пчеларења са једном матицом детаљно је приказана технологија зазимљавања и пролећног развоја пчелињих друштава, која, у суштини, у потпуности важи и за све остале наведене технологије пчеларења. За сваки месец, у оквиру технологије зазимљавања и пролећног развоја пчелињих друштава, наведене су онс фазе и послови пчеларења који су битни за успешно пчеларење. Међутим, послови који су добро познати, овога пута нису детаљно описаны^{*)}.

Бројна литература, која је на крају књиге наведена, трсба да помогне заинтересованим пчеларима да продубе она сазнања која у овој књизи нису детаљно обраћена.

^{*)} Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 1, 2, 19, 21, 32.

2. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА СА ЈЕДНОМ МАТИЦОМ И ТЕХНОЛОГИЈА ЗАЗИМЉАВАЊА И ПРОЛЕЋНОГ РАЗВОЈА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА

2.1. Уводне напомене

Највећи број пчелара са једном матицом. Међутим, пчеларењем на овај начин не постижу се задовољавајући приноси меда, јер у нашим климатским условима, у регионима у којима багремова паща стиже доста рано, пчелиња друштва са једном матицом не могу да се развију у јака друштва са 60-65 хиљада пчела за багремову пащу. Само јака пчелиња друштва са 60-65 хиљада числа могу донети високе приносе меда.

У овом делу књиге детаљније је објашњен поступак пчеларења са једном матицом, али тако да се сквати да пчеларење са једном матицом долази у обзир само ако се користе помоћна друштвата, или нуклеуси за појачавање производних друштава са једном матицом.

Ако пчелар има 20-30 пчелињих друштава са једном матицом, постоји вероватноћа да ће 1-2 пчелиња друштва имати изузетно квалитетну матицу, која ће у периоду од око 20. марта до око 25. априла, приближно, положити око 60.000 јаја (око 2.000 дневно) из којих ће се излећи око 60.000 пчела сабирачица у багремовој паши. Међутим, највећи број пчелињих друштава са једном матицом може да се развије до багремове паше у друштвама која садржи једва 45.000-50.000 пчела. То је обично последица релативно низких температуре у марту, а често и у априлу, тако да матица нема услова за интензивно полагање јаја у том периоду.

У досадашњој пчеларској пракси мало је истицано да се битка за високе приносе меда у багремовој паши води у августу прстходне године. Данас се све више истиче констатација: колико се успешно зазиме пчелиња друштва, толико ће успешно да се врда мед. Због тога се у овом делу књиге детаљно разматра технологија зазимљавања пчелињих друштава, а нарочито послови на пчелињаку у августу, који су пресудни за успешно зазимљавање пчелињих друштава. Ни мало се не прстерује ако се каже да је припрема пчелињих друштава за зиму једна од најважнијих фаза пчеларења, која највише зависи од знања самог пчелара.

2.2. Технологија зазимљавања пчелињих друштава

АВГУСТ

Август је током године један од најважнијих месеци у пчеларењу. Без претеривања се може рећи да пчеларска година почиње 1. августа, када започиње припрема пчелињих друштава за зиму. Искусни пчелари кажу: "Ако се са припремом пчелињих друштава почне 2. августа, већ се касни један дан". Наравно климатски услови могу да утичу на извесна померања овог рока. По правилу овај рок се може померити у сушној години, тако што се започињу припреме знатно пре 1. августа, а у кишној години знатно после 1. августа. Што се тиче климатских разлика у појединим регионима, искуство многих пчелара показује да се најмање греши ако се са припремом пчелињих друштава започне 1. августа^{*)}. Квалитетно зазимљавање пчелињих друштава код било које технологије пчеларења је једна од најважнијих фаза пчеларења, од које изузетно много зависи успех у пчеларењу.

Успешна припрема пчелињих друштава за зиму у току августа највише зависи од квалитета младе матице, односно од интензитета полагања јаја и броја излежених младих пчела, затим од квалитета саћа у колици, од добре вентилације, квалитета хране и полена у колици, од здравственог стања пчела и правовременог обављања потребних послова у вези са припремама за зазимљавање пчелињих друштава.

Најважнији послови у августу су следећи:

- Преглед пчелињих друштава почетком августа,
- Контрола минималне количине резервне хране у пчелињем друштву почетком августа,
- Распоређивање наставака почетком августа,
- Обезбеђивање квалитетног гнезда и сређивање саћа у плодишту,
- Блокада и деблокада матице у току августа,
- Обезбеђивање квалитетне медне кане,
- Стимулативно прихрањивање пчелињих друштава у току августа,
- Замена старе матице,
- Обезбеђивање вентилације у колици и заштита пчелињих друштава од високих температуре,
- Контрола здравственог стања пчелињих друштава,

^{*)} Припреме за зазимљавање по правилу почињу по завршетку последње паше, а 1.август се наводи као упозорење пчеларима да превише не задоцни са припремама.

- Заштита пчела од осица и стршљенова,
- Спречавање грабсжи на пчелињаку и спровођење превентивних мера против грабежи,
- Чување резервног саћа,
- Контрола количине и квалитета резервне хране крајем августа,
- Детаљан преглед и увид у стање пчелињих друштава крајем августа,
- Спајање слабијих друштава са јачим крајем августа,
- Узимање резервних матица.

2.2.1. Преглед пчелињих друштава почетком августа

До првог августа, у току јула месеца, пчелиња друштва су се налазила у стању медобрана. Многа друштва су била на сунцокретовој или ливадској паши, па је крајем јула извршан мед, ако га је било. Почетком августа започињу припреме пчелињих друштава за зиму. Тада се обавља један од најважнијих прегледа пчелињих друштава, када треба утврдити:

- да ли има и колико рамова са поленом;
- да ли има варос на пчелама;
- да ли има кречног легла;
- да ли је подњача чиста, или је треба очистити;
- какво је стање делова кошнице и шта се мора поправити у наредном периоду.

Приликом прегледа пчелињих друштава обавезно:

- сузити лето,
- очистити подњачу,
- извршити контролу саћа у кошници и обезбедити квалитетно радилично саће (из којег су се излегле 2-3 генерације пчела) нарочито у плодишту,
- утврдити која друштва немају минимум 8 kg резервне хране да би им се недостајућа количина хране хитно додала, јер без те минималне количине резервне хране нема смисла вршити стимулативно прихранјивање пчелињих друштава, да би матица интензивније носила јаја,
- обезбедити правилан распоред наставака,
- подесити вентилацију у кошници,
- у пчеларски дневник обавезно забележити: јачину друштва (број рамова са пчелама, број рамова са леглом); квалитет легла, односно квалитет матице, тј. да ли матица полаже јаја у непрекинутом низу, или то чини са пресеком, испрекидано (ретко, небасто легло), па је тресба заменити у том случају;
- заштитити пчелиња друштва од високих температуре, обезбедити воду на пчелињаку, и др.

У току августа, у фази припреме пчелињег друштва за зазимљавање, треба да се обезбеде потребни услови (који ће у наредном тексту бити

детаљно обрађени) да пчелиње друштво уђе у зиму са најмање 25-30 хиљадама младих, квалитетних, здравих пчела, да би из зиме, у фази изимљавања, такво друштво изашло са најмање 20 хиљада пчела.

2.2.2. Концирола минималне количине резервне хране у ичелињем друштву йочешком avgуста

Ако неко пчелиње друштво нормалне јачине (око 10 рамова са пчелама) почетком августа нема минимум 8 kg резервне хране, први и неодложан задатак пчелара јесте да таквом друштву ту количину хране хитно обезбеди. Наравно, код врџања мсда, крајем јула, са последње паше, из плодишта не врџати мед.

Дакле, у случајевима када друштво нема довољно резерве хране, од 1.-5. августа (изузетно до 7.) додавати му свако вече 3-5 литара шећерног спрупа (3:2), односно, онолико сирупа колико може у току ноћи да га друштво преузме, и толико дуго док се обезбеди наведени минимум хране.


Треба имати у виду да ће друштво нормалне јачине преузети сируп у току ноћи и прерадити га за 2-3 дана. Међутим, слабије друштво које ће најчешће у току ноћи преузети исту количину сирупа као и јако друштво, неће моћи сам преузети сируп да преради у мед, па ће остати много сахарозе у резервној храни; такав мед ће кристалисати и пчеле ће га тешко користити.

По правилу, ни једно друштво нормалне јачине не би смело да остане са мање од 8 kg резервне хране ни у једном периоду у току године, односно, без најмање 1 kg хране по улици пчела. А кад се то деси знак је да је пчелар направио велику грешку, која се може делимично исправити, јер друштво које остане без хране (мање од 8 kg), доживљава велики стрес и споро се развија.

2.2.3. Распоређивање наставака йочешком avgуста

Крајем последње паше, тј. после цеђења меда са последње паше, крајем јула, пчелиње друштво се налази у 2-3 наставка. Почетком августа, потребно је да је распоред наставака такав да је на подњачи медиште, са изврзаним рамовима, а изнад медишта плодиште.

У зависности од јачине друштва, стање друштва почетком августа може да буде као на слици 2.1.



Слика 2.1. Радиција снања јачелињих друштава Јочејкотом августом:

- а. - јачелиње друштво са преко 10 рамова са јачелама, са 6-7 рамова са леглом и 6-8 рамова са медом и йоленом; б. - јачелиње друштво са око 10 рамова са јачелама; в. - јачелиње друштво као под б., али без доњег празног наставака; г. - јачелиње друштво са 6-8 рамова са јачелама; д. - јачелиње друштво са 4-5 рамова са јачелама;
- ђ. - јачелиње друштво као под б., са полунаставком Јуним меда испод плодишта.

Пчелиња друштва под б. и в. на слици 2.1. су исте јачине, али једно има испод плодишта празан наставак, са изврцаним рамовима, а друго нема. По оцени многих искусних пчелара (а и аутора ове књиге), тај празан наставак је врло користан из неколико разлога:

- у току топлог августа обезбеђује се са њим добра микроклима у кошници;
- у доњем наставку чува се саћ од мольца;
- у току августа, ако дође до блокаде матице због тога што пчеле запљусну медом централне рамове у плодишту, па матица нема где да положе јаја, такви рамови се спуштају у доњи наставак, а из доњег наставка дижу се горе, у плодиште, квалитетни рамови са радиличним саћем;
- код сређивања саћа у току августа, лоши рамови, са мало меда, могу се стављати у доње наставке да би пчеле из таквих рамова однеле мед горе, у плодиште, у медну капу;
- ако се у доњи, празан, наставак почетком августа стави 1, 2, 3 рама са по мало (или доста) меда, пчелс ће тај мед преносити горе, у медну капу, и на тај начин оствариће се тзв. аутоматско стимулативно прихранјивање пчелињег друштва; уколико нема рамова са месом, може успешно да послужи и рам-хранилица са погачом или сирупом;
- ако се пчелиње друштво зазими у два наставка, односно, ако се у доњи наставак стави 1-2 рама са медом за пчеле, тај мед ће код првог развоја легла у пролеће одиграти значајну улогу;
- ако се у доњи наставак стави квалитетно саће, нарочито ако се у централном делу тог наставка налази 4-6 рамова са квалитетним радиличним саћем, руменим као јабука (из којих су се излегле 2-3 генерације пчела), у пролеће, кад пчеле испуне горњи наставак (плодиште), матица ће се лакше одлучити да сиђе у доњи наставак, ако пчелар закасни са заменом места наставака;

- код замене места наставака, у пролеће, предност доњег наставка је и у томе што су пчеле тај наставак већ обрадиле, односно, тај наставак је већ попримио мирис целог друштва, а поред тога тај наставак је и топлији од наставка који би се тек додао, и пчеле га због свега тога радо и брзо прихватују.

Постављање празног наставка испод плодишта има и низ недостатака:


- у току зиме, кад мало отопли, пчеле излазе на прочисни лет, и морају да пређу дужи пут до лета, кроз празан наставак;

- пчелама је доста тешко да поставе стражу на лету кад је лето јако удаљено од гнезда, што може да утиче на појаву грабежки, нарочито ако је пчелиње друштво слабије;

- у првој половини марта, када је потребно додатно утоплити пчелиње друштво да би се сачувала топлота у гнезду (око 35°C), празан наставак испод плодишта значајно утиче на расхлађење легла, тј. на промену температуре у гнезду. Због тога неки пчелари склањају празан наставак почетком марта.

Поред уобичајених начина зазимљавања пчелињих друштава приказаних на слици 2.1., у пчеларској пракси срећу се и следећи начини зазимљавања:

Празан наставак или полунаставак ставља се изнад плодишта (без рамова) почетком августа (слика 2.2.). Тиме се постиже следеће:



Слика 2.2. Иznад плодишта
празан наставак

Празан наставак се склања крајем септембра - почетком октобра.

Један број пчелара почетком августа ставља изнад плодишта наставак пун меда (слика 2.3.). Овакав начин узимљавања пчелињих друштава крије у себи велику опасност, јер може да се деси да у току зиме пчелиње друштво страда, ма колико оно било јако, иако у кошници има чак и превише меда, и то из следећих разлога:

- При kraju зимског периода, u toku februara i početkom marta, kada može da буде relativno топло, pčele razvijaju leglo u doњem naставku, a hrani koriste iz medne kape doњeg naставka, krećući se naviše. Medna kapa u doњem naставku, u plodishtu, je dosta niska kod ovakvog начина zazimljavanja pcheliñih drushtava. Kad pchele "probiju" mednu kapu u

- prazan naставak prihvata veliki broj pchela, kojih tada ima, i obezbeđuje dobru mikroklimu u košnici;


- kod prihranja pcheliñih drushtava taj prazan naставak iznad plodishtu primorava pchele da dodatu hrani unose u mednu kapu;

- onim pchelarima, koji kao hranilicu koriste tegle, plastичne flase i sl., taj prazan naставak dobro dođe da u njega stave navedenu hranilicu.

доњем наставку, а истовремено нагло захладни, све пчеле ће се повући на доле, у доњи наставак, да покрију легло и да га тако заштите од хладноће. Повлачећи се доле, ка леглу, пчеле губе контакт са храном, која остаје изнад њих, и најчешће, ако хладноћа дуже потраје, страдају од глади, иако у кошници, у горњем наставку, има доволно хране.

- Да би пчеле прешле у горњи наставак који је пун меда, треба да "прескоче" велику препреку и то:


20 mm висине сатоноше у доњем наставку, 7 mm растојања изнад сатоноше у доњем наставку до горњег нивоа доњег наставка, 3 mm растојања у горњем наставку између доњег нивоа наставка и доње летвице рама у горњем наставку, 10 mm дебљине доње летвице рама у горњем наставку. Практично, ако је хладно време, пчеле ту препреку не могу да савладају.



Слика 2.4. Врх клубета захвата доњи део горњег наставка са медом

са квалитетним радиличним саћем, из којег су се излегле 2-3 генерације пчела, да би пчеле на њима изградиле медну капу,

- или, да се крајем августа (односно почетком септембра) у средину горњег наставка убаце 2-3 рама пуна меда, на којима је на доњем делу рама (на висини од око 1/3 рама) отклопљен мед, који ће пчеле убрзо пренети горе, а на празном простору, где је био отклопљени мед, сместиће се врх клубета.



Слика 2.3. Насставак са медом изнад плодништа

Да се ово не би дододило, код зазимљавања пчелињих друштава пуним наставком меда изнад плодништа, потребио је строго водити рачуна да у току августа врх клубета пчела из доњег наставка обавезно захвати доњи део горњег наставка (слика 2.4.) Да би се то постигло постоје две могућности:

- да се почетком августа у средину горњег наставка ставе 2-3 рама



Слика 2.5. Полунастравак йун меда испод плодништа у августу

На крају, може се поставити питање: Који је најбољи распоред наставака почетком августа, којим се обезбечује најкавалитетније презимљавање пчела?

По нашој оцени, најбоље је ако се може, да се почетком августа, код пчелињег друштва са 25.000-30.000 пчела испод плодишта које се налази у два наставка, постави наставак (или полунаставак) са медом који ће пчелама у току августа служити као аутоматско стимултивно прихрањивање, услед чега ће се, са једне стране, формирати квалитетна медна капа, изнад легла, а са друге стране, док пчеле буду преносиле мед из доњег наставка у горњи, изнад легла, матица ће "имати утисак" да је унос нектара обилан, па ће интензивно полагати јаја. Крајем августа, када се формира квалитетна медна капа, медиште (полумедиште) се дигне изнад плодишта (слика 2.5.).

2.2.4. Обезбеђење квалитетног гнезда и сређивање саћа у плодишту Јочејком августа

Три најважнија задатка у вези са обезбечењем квалитетног гнезда и сређивањем саћа у плодишту у току августа су:

- замсна неквалитетног саћа и обезбеђивање квалитетног радиличког саћа у плодишту,
- спречавање блокаде матице услед недостатка квалитетних радиличних ћелија,
- обезбеђивање квалитетне медне капе.

Квалитет пчелињег гнезда, нарочито у току августа, је изузетно значајан фактор за добре припреме и развој пчелињег друштва за наредну сезону.

Ако су лоши рамови са извученим саћем у плодишту, у току августа, у пределу гнезда:

- због лошег воска употребљеног за израду сатних основа,
 - због старог саћа које је готово црио,
- биће много трутовског саћа, а мало радиличног саћа. Практично и најбоља матица ће полагати јаја пуним интензитетом, али од тога биће много трутова, а мало младих пчела, које су неопходне за успешно презимљавање пчелињег друштва. Такође, уколико у гнезду плодишта нема у току августа довољно легла, то значи да је матица блокирана, да нема довољно рамова са квалитетним радиличним саћем, да је већина рамова у гнезду заузета медом и поленом. Чак и веома јако друштво, ако у току августа ислама довољно квалитетних рамова са радиличним саћем у плодишту, односно, ако је матица блокирана из наведених разлога, такво друштво ће у зиму ући са мало младих пчела. Најчешће од таквог јаког друштва у августу биће слабо друштво у пролеће.

Како помоћи пчелињем друштву са неквалитетним саћем?

Одмах, почетком августа, приликом прегледа пчелињих друштава, избацити из плодишта све лоше (прно, извитоперно, трутовско) саће, а на његово место ставити рамове са квалитетним радиличним саћем. Нарочито одстранити из кошице, а пре свега из плодишта, рамове са недовољно извученим сатним основама. Сваки такав рам који заостане у плодишту понашаће се као преградна даска и утицаће на раздавање десета плодишта.

Посебно водити рачуна да се у централном делу плодишта нађе 5-7 рамова са изузетно квалитетним радиличним саћем. То су, по правилу, рамови који су изграђени у току пролећне и летње папе у којима су се излегле 2-4 генерације пчела. У ново изграђено саће матица неће да полаже јаја у току августа, а ако је приморана да у такво саће полаже јаја, јер другог саћа нема, то ће чинити у висома малим количинама. Ново изграђено саће, светле боје, је хладно, односно слабо чува топлоту, за разлику од саћа тамније боје из којег су се излегле 2-4 генерације пчела, које је топлије, односно, које боље чува топлоту у гнезду.

Замсну старог саћа, нарочито у плодишту, требало би вршити током целе године, кад год се такво саће уочи у плодишту*. Када се благовремено замењује лоше саће, обезбеђује се бржи развој друштва, јер се из квалитетног саћа изводе квалитетније пчеле. Из старог и лошег саћа легу се ситније пчеле, тзв. пчеле патуљци, са слабијом радном способношћу и са знатно краћим животним веком.

Како обезбедити квалитетне и довољне количине саћа у плодишту?

Одмах, почетком августа, после врџања меда са последње паше, изврши се такозвано засецање легла, односно, између свака два рама са леглом убаци се по један рам из којег је изврдан мед, румен као јабука, из кога су се излегле 2-4 генерације пчела. Практично, у том периоду у пчелињем друштву има 5-7 рамова са леглом (плодиште пчелињег друштва је у два наставка), и у такво друштво се између рамова са леглом убаце 4-5 рамова са квалитетним радиличним саћем, из којих је претходно изврдан мед.

Пчеле ће такво саће брзо очистити, а матица ће га у току 5-7 дана залсћи. Ако није било врџања меда, уместо изврзаних рамова, гнездо се проширије, тј. легло се засеца са 4-5 рамова са квалитетним радиличним саћем, руменим, у којима су се излегле 2-4 генерације пчела. Саће које се ставља у кошицу обавезно испрскати (шећерним сирупом или водом).

При стављању у плодиште 4-5 рамова са квалитетним, руменим саћем, прилика је да се из гнезда плодишта одстрани неквалитетно саће, било да се помери лево-десно од гнезда, било да се сасвим лоше саће одстрани из кошице и претопи.

*). Замена старог саћа сатним основама по правилу се врши за време тихе паше, а не у главним пашама.

Кроз 5-7 дана, пчелар мора и трсба да изврши контролу: да ли је матица рамове додате пре 5-7 дана засела леглом. Може да се догоди да су пчеле додате рамове запљуснуле медом и да је матица због тога блокирана. Тада се мора деблокирати матица додавањем рамова са извученим, румесним саћем.

2.2.5. Блокада и деблокада матице у току августа

О блокади и деблокади матице већ је било речи. Међутим, треба истаћи и следеће:

- у току августа у пчелињем друштву су висома изражена два инстинкта пчела: један, да се што пре и што више сакупи мед за предстојећу зиму, и други, да матица до краја августа залеже 25-30 хиљада ћелија, како би се излегло исто толико младих зимских пчела. Значи, истовремено у пчелињем друштву јавља се нагон пчела да се сакупи што више меда и нагон матице да положи што више јаја. И једно и друго не може истовремено, и због тога је ту пчелар да помогне пчелињем друштву проширењем и деблокадом гнезда.

Блокада матице се најчешће догађа:

- ако се у току августа додаје сируп (1:1) у већим количинама (преко 200-300 g дневно),

- када се у плодините додају рамови са квалитетним саћем да би их матица залегла, ичеле те рамове запљусну медом и матица бива блокирана, јер нема где да положи јаја. Зато, пчелар мора бар недељно да завири у кошницу, и да склони рамове запљуснуте медом, и да поново дода празне рамове са извученим саћем, румене као јабука.


Зато, ако пчелар у току августа не контролише стање у плодишту, већ то препусти пчелама, може да се деси да крајем августа има много меда, а врло мало легла.

2.2.6. Обезбеђење квалитетне медне капе

Медна капа, односно венац меда на рамовима са леглом изнад легла имабитну улогу за успешно презимљавање пчела. Под нормалним околностима, код нормалних пчелињих друштава, у току августа, ако има доволно уноса нектара, или при правилном прихранјивању пчела шећерним сирупом, пчеле ће саме водити рачуна да сваки рам у гнезду крајем августа има медију капу (9-12 cm). Међутим, уколико се у току августа, а најкасније крајем августа, процени да на неким рамовима у гнезду неће бити добра медна капа, тада се може убацити 1-2 рама са медом (код којих је на доњем делу отворен мед) између рамова са леглом на којима је слаба медна капа. Пчеле ће отворени мед однети са доњег дела рама, и склапаштити га на

рамовима са леглом лево-десно, који имају недовољну медну капу (слика 2.6.).

Ако је, на пример, у одређеној улици са пчелама медна капа слаба, ниска, треба знати, да при ниским температурама (испод нуле) пчеле у тој улици крећу се навише за храном, врло брзо утроше храну у тој улици у медној капи, и попито не могу да се крећу лево и десно од те улице при тако



Слика 2.6. Корекција медне капе једномоћу рама са медом

виским температурама, угину све, заједно са матицом, ако се и она нађе у тој улици. У току зиме, свака пчела, па и матица, се посебно хране, за разлику од лељег периода када пчеле преносе храну једна другој. То још више упозорава на потребу правилног распореда хране у зимском периоду.

2.2.7. Стимулативно прихранјивање пчелињих друштава у току августа

Када се ради о стимулативном прихранјивању пчелињих друштава у току августа ради стимулисања матице да што интензивније полаже јаја, а пчела ради успешнијег неговања легла, пчелама не треба давати дневно више од 200-300 g оплемењеног шећерног сирупа у односу 1:1, јер ће доћи до блокаде матице. Добро је давати пчелама ређи сируп (у односу 1:2, 1:3), са додатком 1-1,5 мас.% полена, који ће истовремено стимулисати матицу да интензивније полаже јаја, а пчеле да интензивније уносе полен. Иначе, квалитетна погача у августу је веома корисна као стимулативно средство, јер пчеле користе погачу искључиво за своје потребе, не и за легло, и то само када нема уноса споља, не прерађују је и не складиште у мед, као што то чине са шећерним сирупом (1:1)*.

Иначе, кад има довољно уноса нектара споља, није потребно додатно стимулативно прихранјивање. Кад се додаје шећерни сируп (1:1), то треба чинити највише по 200-300 g свако вече, или свако друго, евентуално свако треће вече. Додавање шећерног сирупа у величим количинама за дужи рок, на пример, за целу седмицу, изазива блокаду матице и супротне ефекте од жељених. Додати шећерни сируп пчеле знатно ефикасније прерађују ако

*.) У новије време све је више пчеларских истраживача који наговештавају нову технологију припреме пчелињих друштава за зиму, без стимулативног прихранјивања на досадашњи начин.

истовремено преносе мед са рамова са помало меда који су испод плодишта, или иза преградис даска.

Све већи број пчелара користи такозвано аутоматско стимултивно прихранјивање које се састоји у следећем:

- испод плодишта се постави полунаставак (или наставак) са медом, а пошто пчеле не трпе мед испод легла, онце га преносе из наставка испод плодишта, горе, у медну капу, изнад легла, у плодишту;

- ако се не располаже са полунаставком (или наставком) са медом, може се у празан наставак испод плодишта ставити неколико рамова са медом, или са по мало меда, и пчеле ће тај мед, такође, пребацити горе, у медну капу изнад легла, у плодишту.

Веома интересни пчелари у току августа пусте да раде под истим кровом, на истој подњачи, два друштва, две матице (двоматично, двојно), а почетком септембра споје се два друштва у једно, заиста јако друштво, са доста легла, младих пчела, полена и меда, без икаквог стимултивног прихранјивања. Наравно, за овакав систем припреме друштва за зиму услов је да је пчелар овладао узгојем матице на свом пчелињаку пресађивањем ларви, и да располаже са доста нуклуса, ројева.

Наука и пракса су показале да је шећерни сируп (1:1) који се додаје пчелама у оквиру стимултивног прихранјивања, знатно кориснији за пчеле ако се у њега дода сирћетна киселина и то: 3 ml 80 мас.% раствора на 10 kg шећера, или 4 ml 70 мас.% раствора на 10 kg шећера, или 1,9 ml 12 мас.% раствора на 1 литар сирупа; морска со и то 0,5 g на 1 kg шећера у сирупу; кобалт-хлорид и то 24 mg на 1 kg шећера у сирупу; форсалин, према упутству производача.

Наведени додаци поспешују инверзију сахарозе и јачају организам пчела.

2.2.8. Замена стваре матице

Почетком августа при прегледу пчелињих друштава, одмах треба да се замене стваре матице, ако то није учињено раније. Важно је да се тада има у виду следеће: ако је јако друштво дало високе приносе меда у току сезоне, у току августа такво друштво ће имати доста пчела и у плодишту, и у медишту, имаће велику радну снагу, али ако је матица старија, заморена, исцирљена, и ако се таквом друштву не помогне, оно ће у наредном периоду толико ослабити, да се поставља питање и његовог опстанка.

Како помоћи оваквом друштву?

Ако се почетком августа јаком друштву, са великим радном снагом, са доста пчела, али исцирљеном матицом, дода (спајањем) младо друштво (рој, нуклус) са малом радном снагом, али са младом, плодном матицом, искористиће се снага јаког друштва и млада матица младог друштва, а као резултат добиће се јако друштво за зиму.

Матица је добра ако полаже јаја кружно, у континуитету, без преска-
кања појединих ћелија, ако ипак мешавине затвореног и отвореног легла,
тј. ако нема разбацаног легла.

Ако матица у току августа није добра, трсба је одмах заменити.

Ако пчелиње друштво током половине августа има трутове у кошници,
а уз то и доста лошег легла, обавезно матицу треба заменити, без обзира
на јачину друштва.

2.2.9. Обезбеђивање вентилација у кошници и заштита пчелињих друштава од високих температура

Добрим вентилацијом у кошници обезбеђује се потребна микроклима
за нормалан живот и развој пчела. Тако, на пример, добром вентилацијом
у кошници обезбеђује се и потребна влажност у кошници, која је од изузетне
важности. За развој ларви потребно је да влажност у кошници буде
око 90%. Када је влажност испод 50%, престаје излегање ларви.

Током целе године вентилација у кошници мора да буде добра. У току
августа, када су температуре високе, вентилација у кошници мора да буде
посебно добра. То се постиже широм отвореним летом и додатним отво-
ром изнад плодишта, било у хранилици, било у поклонпој дасци.

Као солидно решење за добру вентилацију у августу јесте, поред широм
отвореног лета на подњачи, постављање вентилационе мреже изнад плоди-
шта, са кровом подигнутим на задњој страни.

Отворене рупе (Φ 25-30 mm) на наставцима такође доприносе бољој
вентилацији у кошници.

Уколико пчелар не располаже вентилационом мрежом, нити има избу-
шене рупе на наставцима, додатна вентилација се може постићи ако се
горњи наставак повуче уназад толико да се на предњој страни обезбеди
отвор од око 4-5 mm по целој ширини наставка.

Да ли је вентилација у кошници добра или лоша (на температури од
 30°C) најбољи је показатељ појава браде коју чине пчеле на полетаљци, или
испод полетаљке. Кад пчле праве браду на полетаљци, или испод
полетаљке, кад висе у облику малог роја (браде), знак је да вентилација у
кошници није добра и тада пчелар треба да помогне пчелама подешавањем
вентилације у кошници, отварањем додатних отвора на кошници.

Да би се пчелиње друштво у кошници заштитило од високих темпера-
тура, није потребно кошници стављати у хлад, нити је потребно покривати
је. Довољно је да се кошници на сунцу стави један лист новина испод крова,
да се обезбеди добра вентилација у кошници и да на пчелињаку има увек
довољно чисте воде са појилицама за пчесле.

2.2.10. Конирола здравственог стања пчелињих друштава^{}*

У току августа, нарочито половином августа, право је време за третирање пчела против варос. Греше сви они пчелари који, ако им се учини да исма варос у пчелињем друштву, једноставно не врше никакво третирање пчела против варос у августу. Једно од најважнијих третирања пчела против варос у току целе пчеларске године јесте августовско третирање пчела.

Весома је битно да се после третирања пчела против варос, утврди стање варос у пчелињем друштву, односно, да се изврши провера ефикасности употребљених лекова. То је најсигурује учинити на следећи начин: одабре се око 10-15% пчелињих друштава на пчелињаку и из сваког од њих, са поједног централног рама са легом се узмс око 100 пчела и ставе се у провидну чашу. У чашу се сипа врућа вода ($70-80^{\circ}\text{C}$), са мало детергента који се користи у домаћинству за прање судова. Сва вароа ће врло брзо отпасти са пчела и пасти на дно чаше, па се лако може пребројати. Ако има више од 10 вароа у чаши, значи да је друштво заражено са прско 10% вароом, што је много. Дозвољено је највише 4% варо у пчелињем друштву у току јесени, а у току пролећа, чак и мање (1-3%).

У току августа треба превентивно третирати пчеле и против ноземозе.

У августу се најчешће појављује и кречно легло, нарочито код слабијих пчелињих заједница. Многи искусни пчелари сматрају да је најбољи лек против свих болести пчела и пчелињег легла, па и против кречног легла - јако друштво.

У нашим пчелињацима све је више америчке куге. Због тога, у току августа код сваког прегледа пчела трсба обратити посебну пажњу и на појаву ове опаке болести.

2.2.11. Заштита пчела од осице и стришљенова

Осице и стришљенови су права напаст за пчеле. Пчелар се против њих може превентивно борити на неколико начина:

- не држати на пчелињаку слаба друштва, јер су таква друштва прави мамац за осице,
- затворити све отворе на кошници, нарочито споредне отворе (пукотине и прскотине на кошници и сл.) кроз које осице лако улазе у кошницу,
- код слабијих друштава сузити лето,
- приликом прихрањивања друштва, строго водити рачуна да се не расипа и не раствура храна по пчелињаку.

^{*}) Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 29, 30, 31.

Поред наведених начина одбране од осица и стршиљенова, потребно је поставити и мамцс (клопке) за осице и стршиљенове на следећи начин:

- на сваку другу-трчију кошници постави се по једна боца са пивом (до 1/3 боце) заслађеним са мало шећерног сирупа и сл., у које ће осице и стршиљенови улазити. Пчеле неће улазити у ове боце. Ако се у боце стави сируп, улазиће у боцу и пчеле.

- такође на сваку другу-трчију кошницу поставити теглу са пивом (до 1/3 теглс), а на отвор тегле ставити ловак (направљен од пресечене пластичне боце). Кад се тегла нацуне осицама и стршиљеновима, лако се садржај тегле избаци, а тегла стави у функцију хватача осица и стршиљенова.

Наравно, кад год се уочи осиње гнездо, треба га уништити.

2.2.12. Сиречавање грабежи на пчелињаку и сировођење превентивних мера

Кад се унос нектара знатно смањи, кад настане безпашни период, опасност од грабежи је велика. Грабеж је толико опасна појава на пчелињаку да може да уништи цео пчелињак, ма колико он био велики. Под грабежом се подразумева појава када пчеле из једне, или више кошница са истог, или другог пчелињака, улазе у туђе кошнице и односе из њих мед.

Грабеж на пчелињаку појавиће се:

- ако се на пчелињаку држи слаба друштва,
- ако се пчеле прихрањују сирупом у току дана,
- ако се по пчелињаку расипи храна,
- ако се сађе са медом, хранилице и сл., остављају којскуда на пчелињаку,
- ако на кошници има споредних отвора, итд.

Са појавом грабежа на пчелињаку јављају се многе невоље:

- нестанак хране нарочито код слабијих друштава,
- губитак матице, а најчешће и целог слабијег друштва,
- појава вароје и других болести пчела које преносе пчеле туђице приликом грабежи.

Да до грабежи не дође, превентивно треба учинити следеће:

- код слабијих друштава (ројева, нуклеуса) сузити лета тако да може да прође 1-2 пчеле,
- уместо сирупом користити погачу,
- са сирупом руковати изузетно правилно (прихрањивање искључиво увече),
- не држати слаба друштва на пчелињаку,
- одржавати хигијену на пчелињаку,
- код прегледа друштава водити рачуна да се пчеле не узнемирају (прегледе вршити ујутру и увече).

Ако се грабеж ипак појави, најбоље је нападнуту кошницу однети 4-5

km даље од пчелињака, где ће се све пчеле (и туђице) ујединити у једно друштво. Наравно, на новој локацији лето на кошници треба одмах отворити.

Доста успешно заустављање грабежи постиже се ако се преко лета нападнуте кошнице привеже стара завеса, која онемогућава излазак пчела из кошнице и улазак туђице у кошницу. На тај начин све ће се пчеле (и туђице) ухватити на завеси као грозд. Увече, кад туђице оду, сузити листо за пролаз 1-2 пчеле.

2.2.13. Чување резервног саћа

Пчелар се труди да му пчеле извiku што вишe саћa, а затим, збog не-пажње, мольци му уништице све саћe. Да до тога не би дошло, у августу се мора водити рачуна о чувању саћa, о заштити саћa од мольца.

Саћe се може заштитити од мольца на вишe начина, али следећa два су најбољa:

- да се наставак са резервним саћем стави испод јачег друштва (испод плодишта) где ћe гa самe пчеле успешио штитити од мольца,
- да се резервно саћe стави у наставак, да се наставни ставе један изнад другог, да се одозго (и са стране) добро затворе наставници и да се затим одоздо добро задими саћe сумпорном траком (сваких 15-20 дана).

Саћe из којег се пчеле нису излегале (ново саћe) мольци по правилу не нападају и такво саћe се може од мольца чувати у наставцима који су складиштени на сувом месту. Међутим, понекад мольци и такво саћe нападају.

2.2.14. Контрола количине и квалитета резервне хране крајем августа

Крајем августа је последња контрола пчелињих друштава у погледу довољне количине резервне хране и квалитетне медне капе. Уколико је потребно поправити медну капу и обезбедити већу количину хране додавањем сирупа (3:2), то се може учинити најкасније до 15. септембра.

Колико квалитетне резервне хране треба обезбедити пчелињим друштвима?

Једном просечном пчелињем друштву (10 рамова пчела) потребно је обезбедити најмање око 1,5 kg хране (меда и полена) по свакој улици зазимљених пчела, тј. око 16 kg резервне хране. Ако се зна да такво друштво у току зимског периода (октобар-фебруар) потроши око 5-6 kg, и још 8-10 kg за први пролећни развој друштва (до појаве обиљне воћне паше), онда је наведених 16 kg хране довољно. Наравно, од веће количине резервне хране (20 и вишe килограма) не могу настати штете. Напротив, што је

више хране у кошници, добро распоређене, друштво ће утолико бити способније за високе приносе меда.

Добро зазимљено пчелиње друштво у ЛР-кошници треба да има по 2 рама до зида кошнице пуна медом и поленом (8-10 kg меда) и по 6 рамова, на којима је легло (клубе), са квалитетном медном капом (6-8 kg меда).

Ако се зазими пчелиње друштво са огромним количинама резервне хране (преко 18-20 kg меда, тј. преко 2 kg меда по улици пчела), у таквом друштву ће у току пролећног развоја матица изузетно интензивно полагати јая, без обзира на временске услове и слаб унос нектара споља.

Такво друштво, које има резервне хране у изобиљу, по правилу је најквалитетније, најпродуктивније са квалитетним пчелама и квалитетним леглом. Такво друштво, са пуно меда, како год да му се формира пчелиње клубе у току зиме, увек ће имати максимални контакт са храном. Честа захлађења у пролеће таквом друштву најмање сметају. Такво друштво ће у пролеће имати буран развој, а у главној папи оствариће високе приносе.

Када се као резервна храна за пчеле користи шећерни сируп, треба имати у виду следеће:

- у свакој пчелињој храни полен игра битну улогу, јер без полена нема одгајања легла. Заправо, пчеле могу да однегују легло на храни без довољно полена, али због тога што нема довољно полена, користе део беланчевина из свог организма. Такве младе пчеле које се излегу из друштва у коме није било довољно полена, живе веома кратко, 6-10 дана, уместо 35-40 дана колико живе пчеле однеговане храном у којој има довољно полена. Са храном без довољно полена биће пуно легла, пуно младих пчела, али врло мало сабирачица. Природни полен је једини који одговара пчелама, тако да не постоји потпуна замена за полен. Ипак, добра замена за полен је, на пример, храна која се састоји од обезмашћеног млека, пиварског или лекарског квасца. Таква храна је довољна за производњу дosta легла, а пчеле са таквом храном живеће нешто дуже него без ње, 10-15 дана. Међутим, и то је далеко од нормалне дужине живота пчела;

- одрасле пчеле могу на шећерном сирупу да опстану, јер им шећер служи само као енергетска храна. Али на храни од шећера нема рецропулације друштва, нема легла. Дакле, шећер је добар само као (зимска) храна одраслих пчела. Због тога, ако неко друштво има и преко 20 kg резервне хране од шећерног сирупа, треба знати да ће такво друштво успешно преживети зиму, али ће се безуспешно развијати у рано пролеће без полена.

Код допуне хране додавањем шећерног сирупа, најбоље је користити шећерни сируп 3:2 (3 дела шећера, 2 дела воде), односно сируп у коме је садржја шећера око 60 мас. %. Такав састав сирупа најмање изнурује пчеле приликом његове прераде. Такође треба имати у виду и следеће:

- оптимална количина шећера која се може давати пчелињем друштву треба да износи по око 0,5 kg по улици пчела, а никако више од по 1 kg по

улици пчела; то значи, ако пчелиње друштво има 9-10 улица са пчелама, треба да има најмање 16 kg резервне хране, а од тога не више од око 5-8 kg хране добивене прерадом шећера,

- у сирупу за прихранјивање (3:2) добро је додати сирћетну киселину, морску со и др., о чему је већ било речи у вези са стимултивним прихранјивањем пчелињих друштава,

- за време прихранјивања пчелињих друштава шећерним сирупом, пчеле знатно брже и ефикасније пресрађују шећер ако истовремено преносе мсд из неког рама са медом, који се налази испод легла, или иза преградне даске у плодишту.

Свако пчелиње друштво нормалне јачине треба да има 2-3 рама са пергом-цветним прахом заливеним медом. Због тога у току августа треба стимулисати пчеле да сакупљају што више цветног праха, прихранјивањем ређим сирупом (1:2; 1:3, тј. на један део шећера, два или три деса воде).

Зашто је потребно прихранјивање пчелињих друштава завршити до краја августа (свентуално до 15. септембра)?

Прерада шећерног сирупа у резервну храну је изузетно тежак и исцрпљујући посао за пчеле. Циљ је да шећерни сируп прераде старе пчеле, чији ће се животни циклус свакако ускоро привести крају, а не младе, зимске пчеле које се легу из августовског легла.

Ако би се шећерни сируп давао после 15. септембра, тада би сируп прерадиле и младе, зимске пчесле, а тај посао би њих знатно изнурио, трошио, што би се одразило на успешно презимљавање пчелињег друштва.

Шећерни сируп, који старе пчеле прераде у резервни мсд, мора да буде поклоњен, затворен. То чине пчеле које у току августа још увек луче восак и могу успешно да поклоне (затворе) сав мед. После 15. септембра пчеле не луте восак, и ако би се давао шећерни сируп, пчеле би тај сируп прерадиле у мед, уз значајно изнуђивање пчела, али тај мед не би био поклоњен. Непоклоњен мед није добар за пчеле, јер може да укисне и сл. Поред тога, треба истаћи да се пчелијни сируп може додавати пчелињим друштвима само дотле, док има добра легла у друштву. То је због тога што је тада температура непосредно изнад легла, у пределу где пчеле депонују сируп и где га прерадују у мед, око 30°C . Та температура је управо она температура на којој се најбоље прерадује (инвертује) шећер у резервну храну. Ако нема довољно легла, тада нема повољних услова за прераду шећерног сирупа.

На крају, трсба истаћи и то да ће младих, зимских пчела после 15. септембра бити у све већем броју, и да свако додавање сирупа после тог рока, доводи до ангажовања и младих пчела на прераду сирупа. Тада тежак посао прераде сирупа изнуђиваје младе пчеле, и оне ће бити све мање способне да успсно пресиме и да обезбеде пролећни развој друштва.

Кад се ради о квалитету резервне хране, треба истаћи да је мед-медљниковац као резервна храна, штетан за пчеле.

За разлику од багремовог, липовог, ливадског, сунцокретовог и другог цветног меда, који настају од нектара којег пчеле сакупљају са цветова одговарајућег биља, медљиковац не потиче од нектара са цветова, већ настаје на следећи начин:

- лисне ваши које се хране соковима из лишћа појединих врста дрвећа, то чине тако што боцкају листове да би дошли до сокова биљке. Избоцани листови луче сокове да би оштећена места на листу зарасла. Ти сокови су слатки и пчеле их ради сакупљају и прерађују у мед, медљиковац,
- у току августа и септембра из зрелих напуклих плодова, или из плодова које су претходно избушиле осе и стршљени, пчеле сину сокове и прерађују их у мед, медљиковац.

Медљиковац (шумски мед) је изузетно тражен и квалитетан мед за људску исхрану, али је изузетно штетан као зимска храна за пчеле. Нарочито је за пчеле опасан медљиковац настао од воћних сокова.

Уколико се медљиковац појави, а појављује се једном у сваких 4-5 година, мора се извршити крајем августа и затим давати сируп.

Уколико се медљиковац појави у мањем обиму, он неће представљати велику опасност за пчеле, ноготову у периодима када пчеле могу нормално да излеђу из кошнице. Међутим, и у таквим случајевима препоручује се да се крајем августа из централног дела плодишта склоне лево-десно 2-3 рама са приметним количинама медљиковца, а на њихово место треба додати 2-3 рама са квалитетним радиличним саћем, а затим додати шећерни сируп (3:2), све док се из тим рамовима не формира медна капа. Такође, ако медљиковца има, али не и за вридање, добро је да се кад престане легло (у октобру) дода 1-2 л шећерног сирупа (1:1 или 3:2), који ће пчеле прерадити у мед и депоновати директно изнад клубета, и биће им храна "на дохват руке" усред зиме, када им је и највише потребна лака храна, каква је храна од шећерног сирупа.

Код процене резервне количине хране у кошници треба имати у виду да саће површине 1 dm^2 има око 160 g меда са сваке стране рама, дакле укупно око 320 g.


2.2.15. Детаљан преглед и увид у сијање пчелињих друштава крајем августа

Крајем августа је неопходно извршити детаљан преглед свих пчелињих друштава да би се утврдило:

- да ли свако пчелиње друштво има доволно легла да би се из њега излегло 25-30 хиљада младих зимских пчела,
- какав је квалитет легла, тј. да ли је матица квалитетна,
- да ли пчелиње друштво има доволно резервне хране,
- да ли је медна капа добра,
- да ли је саће у гнезду квалитетно,

- да ли је распоред наставака код пчелињих друштава у два наставка, правилан;
- да ли је растојање између рамова око 11 mm.

Пчелиње друштво нормалне јачине трсба да има легла површине 60-70 dm², односно, да има 5-7 рамова са леглом и квалитетном медном капом да би се из њега излегло 25-30 хиљада младих зимских пчела. Ако пчелиње друштво нема наведену површину лсгla, обавесно му се мора додати недостајуће легло из помоћних друштава, иуклеуса и сл. Ако пчелиње друштво крајем августа има мање од 5-6 рамова са пчелама и мање од 3-4 рама са леглом, оно је слабо и треба га припојити јачем. Приликом дисталног преслуда пчелињих друштава крајем августа, могућа су различита стања пчелињих друштава, приказана на слици 2.7.



Слика 2.7. Стање пчелињег друштва крајем августа:

- а. пчелиње друштво са 10-12 рамова са јчелама и са 6-7 рамова са леглом, са квалитетном медном капом (9-12 cm);
- б. пчелиње друштво са око 10 рамова са јчелама и са 6-7 рамова са леглом, са квалитетном медном капом;
- в. пчелиње друштво истио као под б., али без доњег наставка;
- г. пчелиње друштво са 6-8 рамова са јчелама и 4-5 рамова са леглом и са квалитетном медном капом;
- д. пчелиње друштво са 5 и мање рамова са јчелама и са 3-4 рама са леглом;
- ђ. и е. пчелиње друштво као под а., б. или в., али са полунаставком (пуним меда) изнад љодишића.

Пчелиње друштво је добро припремљено за зиму ако је зазимљено као што је приказано на слици 2.7. под а., под условом да се пчелиње клубе налази око 1/3 у горњем и око 2/3 у доњем наставку и да има најмање 16 kg резервне хране. Такође је добро зазимљено друштво као што је приказано на слици 2.7 под б. и в. али су та друштва за нијансу слабија од друштва приказаног под а.

Пчелиње друштво приказано на слици 2.7. под г. ако се добро утопли у октобру, успишио ће презимити и биће добро помоћно друштво, али не и производно друштво. Међутим, ако се оваквом друштву крајем августа дода 1-2 рама са леглом из помоћних друштава, оно ће ући у зиму са око 20 хиљада пчела и моћи ће да се развије у производно друштво у пролеће.

Пчелиње друштво приказано на слици 2.7. под д. је слабо и њега треба пријојити јачем друштву. Али, уколико је у њему млада матица, треба му сузити гнездо преградном даском, утоплити га и ставити изнад јачег друштва, прско преградис даске са летом, са замреженим дном. Овакво слабо друштво, уз топлоту доњег друштва (слика 2.8.) успесно ће преживети зиму, и сачуваће матицу за пролеће, када ће она бити од велике користи.

Сваком пчелару треба да буде циљ да постигне зазимљавање пчелињих друштава какво је приказано на слици 2.7. под б. и а.

Ако је легло лоше, расуто, ретко, најмање што се тада мора и може учинити, јесте замена матице новом, младом матицом, спајањем таквог друштва са нуклеусом са младом матицом.

Ако пчелиње друштво нема дољну количину резервне хране крајем августа, хитно му треба додавати шећерни сируп (3:2), све док се не обезбеди довољна количина резервне хране, али никако касније од 15. септембра, водећи рачуна да је период без-пашни и да стално постоји опасност од грабежи.

Ако медна капа није добра, нарочито на рамовима са леглом, може се поправити додавањем рама са медом (са отвореним медом на дну) између рамова са леглом са недовољном медном капом.

Ако саће у плодишту, у гнезду, нарочито на 6-8 рамова није квалитетно, тј. ако је направљен пропуст, па се неки лошији рам пронађе, одмах га заменити квалитетним рамом из помоћног друштва.


Код пчелињег друштва зазимљеног у два наставка, у доњем наставку, испод гнезда плодишта, у централном деслу доњег наставка, треба да се налазе 4-6 рамова са квалитетним радиличним саћем. Ако се такви рамови не налазе у наведеном наставку, заменити постојеће рамове рамовима са квалитетним радиличним саћем.

О значају растојања између рамова мало се говори. Нормално растојање међу рамовима износи око 11 mm. Шта се дешава ако је то растојање мање или веће од оптималног?

Код јаких друштава у пролеће смањење међурамног растојања у плодишту изазива појаву ројевог нагона. Код слабијих друштава смањење тог растојања на око 9 mm позитивно се одражава на пролећни развој друштава.

Ако је међурамно растојање 8 mm и мање од тога, настају велики проблеми у развоју друштва, јер се матица не може кретати по кошници и рамови са таквим међурамним растојањем су недоступни матици.

Ако је међурамно растојање веће од 11-12 mm, а мање од 15 mm, код



Слика 2.8. Зазимљавање резервних матица

јачих друштава штете због тога су иезнатие. Али, ако је то растојање веће од 15 mm, матица у такво саће не полаже јаја. Између саћа са таквим растојањем пчеле граде заперке, дограђују ново саће, што све скупа наноси велике штете таквом друштву.

2.2.16. Спајање слабијих друштава са јачим крајем avgusta

Пчелиње друштво које је слабо крајем августа треба припојити јачем друштву.

Слабо пчелиње друштво иа пчелињаку је велика несрећа, прво за само друштво, а затим и за пчелара. Слабо пчелиње друштво је подложно свим болестима пчела и пчелињег легла. Оно ће имати и нозему и кречио легло, и прехлађено легло. Њега ће и напasti и осице, и стршљенови, као и друге пчеле (грабеж). Оно неће моћи да сакупи довољно меда за себе, па се мора прихрањивати. У слабом друштву матица не испољава све своје квалитете, а пчеле које се развијају у таквом слабом друштву су лошијег квалитета и краће живе. Ето, то су разлози за закључак да је слабо друштво велика несрећа пре свега за само пчелиње друштво, а и за пчелара.

Када се ради о спајању друштава, у пракси се показало као најбоље решење припајање не јаким, већ припајање средње јаким пчелињим друштвима слабијих друштава чија је јачина око 30% јачине друштва којем се припаја, под условом да слабија друштва иису безматична друштва (безматак) и да су здрава. Спајање два или више слабих друштава у једно друштво никако се не препоручује.

На крају, ако пчелар успе да добро зазими слабо друштво, пред багремову пашу коистатоваће да је слабо друштво појело само једну погачу мање од јаког друштва, али је и даље остало слабо, па према томе и неупотребљиво.

Пчелар који себе успе да убеди да на пчелињаку не држи слаба друштва, који свако такво слабо друштво хитно спаја са јачим (под условом да је слабо друштво здраво), постао је прави пчелар.

2.2.17. Узимљавање резервних матица крајем avgusta

Постоји само један случај када слаба друштва (са 3-5 рамова са пчелама) треба посебно припремити и зазимити, а то је случај када се у таквим друштвима (нуклеусима) иалази млада, квалитетна матица, коју треба сачувати као резерву за пролеће. Таква друштва, са довољно резервне хране, обавезио се постављају изнад јачих друштава, да би захваљујући топлоти доњег, јачег друштва успешно презимила. Подна даска (ПД) која раздваја доње друштво од горњих, слабијих друштава, треба да је замрежена

(слика 2.8)^{*)}.

Резервне матице могу се зазимити у нуклеусима са по 5 рамова, или са 3 рама као на слици 2.8.

СЕПТЕМБАР

У септембру месецу у пчелињим друштвима се осећају велике промене: пчелиња друштва се увсико припремају за дужи период зимског мирана. Ако су сви послови у августу урађени на време и квалитетно, период мировања пчела би могао и да почне, јер су пчелиња друштва спремна за зимовање. Али није увек тако. И поред тога што сваки пчелар зна да су послови на пчелињаку у августу важни, ипак се понешто и пропусти и не стигне, па се ти заостали послови морају завршити што пре у септембру.

Иако се у септембру, по правилу, не очскује цветна паша, ипак се дешава да услед обилних киша крајем августа, после сушног леста, цвета и обилно меди, са дosta полена, бели босиљак, астер, бела детелина, мајчина душица, мтвица, семенски сунцокрет и друго коровско биље.

Крајње време је:

- за допуну резервне хране (до 15. септембра),
- за контролу квалитета саћа у плодишту,
- за спајање слабих друштава са јачим,
- за стимулисање пчела да уносе што више полена,
- за контролу распореда резервне хране и квалитета медне капе,
- за регулисање отвора леста,
- за контролу присуства варос и обавезно третирање против варое,
- за контролу појаве америчке куге,
- за поправку и сређивање кошница.

У току септембра потребно је и даље водити рачуна о појави грабежи на пчелињаку, о одржавању хигијенске појилице на пчелињаку, о борби против осица и стршљенова, о нези ројева, о чувању резервног саћа.

После 15. септембра ако се обезбеди да друштво има најмање 20-25 хиљада младих пчела, пчелара ново легло више не треба да занима. Много је важније да се обезбеде услови да се младе пчеле нормално излегу. Појава легла крајем септембра и после тог времена, нарочито кад је у већој мери, знак је да са тим друштвом нешто није у реду. То може да буде знак да је дosta пчела страдало у току септембра (нпр. због појаве варое и сл.), па матица настоји да тај губитак пчела надокнади. Међутим, пчеле из легла насталог крајем септембра и касније, нису добре: краће живе, свако по нешто недостаје.

И у току септембра могу се пчелиња друштва спајати. Боље је спојити слабо друштво са јачим, него оставити и даље слабо друштво да зимује. Слабо друштво ће у току зиме појести више хране него јако друштво, а ако

^{*)} Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 24.

презими, оно може да буде свентуално употребљено као помоћно друштво, а никако као производно.

ОКТОБАР

У октобру месецу нема више развоја лсгла. По правилу, у ово доба године у највећем броју кошница нема легла. Тек у по неком друштву може да се нађе на 1-2 рама по једна, до две шаке легла (затворсног). У октобру нема уноса нектара. Може се једино приметити да по која пчела уноси полен са ретких расцветаних биљака. Осећа се приближавање зиме.

Ако је до тада све урађено како треба, пчелиње друштво је потпуно спремно за зиму. Ипак, и у овом месецу за пчелара има послана пчелињаку.

Један од тих послова је сужавање гнезда. Последњи је моменат и могућност да се изврши контрола гнезда и да се рамови са медом примакну ближе до гнезда, као и да се сузи гнездо на број рамова са густо запоседнутим пчелама, нарочито код слабијих друштава. Према томе треба имати у виду следеће:

- Опи пчелари који су пчелиња друштва зазимили тако да се у ово доба године у плодишту, у горњем наставку, налази најмање 8 рамова густо запоседнутим пчелама, немају потребе да приступе сужавању гнезда.

- Наравно, пчелиња друштва са преко 25.000 пчела су добро зазимљена и доволно снажна да могу успешно да презиме и да се у пролеће развију у јака друштва за пловну пашу.

- Ако пчеле густо запоседају пст, шест или седам рамова са пчелама, веома је значајно да се иза последњег рама који је запоседнут пчелама (значи иза петог, шестог или седмог рама) постави преградна даска. Иза преградне даске поставе се рамови са по мало меда и празни рамови. Пчеле ће мед из рамова са медом иза преградне даске пренети у гнездо, изнад клубета.

- Свако друштво које у ово доба године има мање од 8 рамова са пчелама, са ризиком улази у зиму. Тај ризик је знатно мањи, ако се таквом друштву сузи гнездо на број запоседнутих рамова са пчелама, и ако се добро утопли.

- Ако пчелиње друштво у ово доба године има мање од 5 рамова са пчелама, одмах треба проверити да ли је оно здраво. Ако је здраво, треба закључити да је оно заиста слабо развијено и да као такво нема услова да самостално превижи зиму, па га треба одмах спојити са јачим друштвом.

- Међутим, ако је такво друштво рој, нуклеус, који је касније формиран и који није имао услова да се развије, а има најмање 3 рама густо запоседнута пчелама, и добру, младу матицу, треба га добро утоплити и ставити га изнај јаког друштва, преко подне даске са замреженим дном, тако да га током целе зиме греје топлота из доњег, јаког друштва (слика 2.8.).

- Често се у средини гнезда нађу рамови пуни меда, без празних ћелија на дну рама. Такве рамове треба ставити лево-десно у гнезду, а у централном делу гнезда посебно водити рачуна да буду 1-2 рама са добром, квалитетном медном капом, и обавезно са празним ћелијама на дну таквог рама, најмање на 1/3 доњег дела рама.

Следећи важан посао је контрола на америчку кугу^{*)}. У ово доба године обавезно извршити контролу на америчку кугу кад нема легла. Ако се појавила ова опака болест на пчелињаку, она се тада најлакше уочава. На појединим рамовима у гнезду могу се видети заостале ћелије затвореног легла, по 1, 2 или више ћелија са рупицама, и са лигавом, растегљивом и смрдљивом масом у ћелији. То треба да буде знак на узбуну. Пчелар је обавезан да однесе узорак таквог саћа, са наведеним опитењем ћелија, на контролу у ветеринарску станицу. Уколико се при детаљном прегледу кошнице, рам по рам, не пронађе ниједна ћелија са затвореним леглом у кошници, куге исма.

Утопљавање пчелињих друштава се врши управо у октобру. Многи искусни пчелари не утопљавају своја друштва пре зими и тврде да су им друштва добра. Управо због тога треба истаћи следеће:

- Пчелиња друштва, ако су добро припремљена за зиму, а то значи ако су здрава, ако имају дosta младих пчела, ако имају квалитетну храну (меда и полена), ако имају довољно прополиса, ако су, дакле, биолошки заптићена од зиме, успешно ће презимити и најтежу зиму, без икаквог посебног утопљавања.

- Али, ако су таква друштва и физички заптите од зиме утопљавањем, трошић мање меда у току зиме, а то значи да ће се организам пчела мање изнуривати у току зиме, па ће такво друштво из зиме изаћи још спремније за даљи развој, за разлику од друштва које уопште није утопљавано.

- Код утопљавања пчелињег друштва у октобру треба водити рачуна да се обезбеди пчелама одговарајућа микроклима, тј. да у кошници буде чист ваздух у сваком тренутку, односно да у кошници нормално функционише доток чистог ваздуха доле на листу, и одвођење водене паре горе, изнад плодишта, изнад поклопне даске, испод крова.

Као материјал за утопљавање изнад плодишта најбоље је користити новинску хартију (слој од 4-5 листова хартије), стиропор, картон (слојевити), вуну, рогоз, шевар, сламу и сл.

Топлота која се ослобађа у кошници услед прераде меса, креће се навише и њу задржава материјал којим је извршено утопљавање. Међутим, водена пара (влага) која се takoђе ослобађа при овом процесу, подиже се на горе и кроз горњи отвор на колпиници излази из кошнице и директно при томе влажи материјал којим је извршено утопљавање. Из тога разлога с времена на време овлажену хартију (картон, стиропор) треба заменити сувим.

^{*)} Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 29, 30, 31.

Ако вентилација у кошници није добра, односно, ако нема горњег отвора на кошници, ако се водена пара не одводи из кошнице, већ остаје у њој, или супротно, ако је у кошници промаја, спроведено утопљавање није од користи.

С обзиром да се у последње време све више пропагира загревање кошнице, можда овом приликом треба истаћи да један број искусних пчелара, уместо загревања кошница, све кошнице у ово доба године обмотава тер-папиром, који се скиса тек крајем априла, или обавија спој између два наставка широком лепљивом траком (селотејл и сл.). Нека искуства указују да друштва заптићена на овај начин знатно ређе оболевају од ноземозе, боље се развијају у пролећу, тропи мање меда у току зиме, и др.

Поред најведених послова у октобру, трсба урадити и следеће:

- ако је било медљике у кошници, пожељно је у ово доба године прихранити друштва са 2-3 l сирупа (3:2).

- изврпiti контролу на присуност варој, па ако је има, обавезно обавити још једно третирање против варој, а пре тога препоручује се да се рамови са затвореним леглом извуку из кошнице, да се легло отвори виљушком и да се под јачим млазом воде испере све легло. Ако би се рамови са леглом поново вратили у кошницу да га пчесе очисте, сва вароја би из легла преплала на пчеле. Најбоље је да се такви рамови ставе у посебну кошницу, па кад се пчесе излегу, да се изврпи потребан број третирања против варој.

- заштити лета од улаза мишева у кошницу, било да се на лета ставе металне или пластичне решетке, било да се висина лета регулише на 6-7 mm,

- поставити на лета заптитнике од ветрова,
- ставити на подњачу тер-папир или чвршићу пластичну фолију величине која одговара унутрашњим мерама кошнице, да покрива цело дно подњаче, тако да у пролеће, после вађења тер-папира или фолије, подњача остаје чиста, а на тер-папиру, као на фотографији, види се како је друштво зимовало,

- уколико пчелиње друштво из било којих разлога нема довољно резервне хране, нити добру медну капу на рамовима у гнезду, а пчелар жели по сваку цену да то друштво задржи, једино решење је додавање шећерне (или шећерно-медне) погаче изнад клубета.

Од октобра, па на даље, ако пчелиње друштво има квалитетну резервну храну, добру вентилацију и све остало о чему је било до сада речи, потребно је једино још обезбедити мир на пчелињаку.

НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР, ЈАНУАР

У току новембра, децембра и јануара пчелињим друштвима треба обезбедити потпуни мир. Повремено треба проверити вентилацију и материјал којим је извршено утопљавање, али ако је тај део посла урађен како треба,

у пчелињак практично не треба улазити.

Иначе, у току новембра, децембра и јануара, утопљено пчелиње друштво нормалне јачине, потроши 4,0-4,5 kg хране (45-50 g дневно), а ако није утопљено, у зависности од временских услова, може да утроши и дупло више.

2.3. Изимљавање и предпролећни развој пчелињих друштава

ФЕБРУАР

Период фебруар-март везан је за процес изимљавања и предпролећног развоја пчелињих друштава.

Период изимљавања пчелињих друштава је изузетно значајан за свако пчелиње друштво: матица све више полаже јаја, у гнезду је температура око 35°C , расте потрошна храна.

У фебруару, најчешће због ниских температуре, пчелар не може много да помогне пчелињем друштву. Помоћ пчелара могла би једино да буде:

- у чишћењу подњача, ако дозволе временске прилике,
- у додавању оптималне погаче средином фебруара^{*},
- у контроли и замени материјала за утопљавање,
- у врло детаљном утопљавању пчелињих друштава крајем фебруара и почетком марта.

МАРТ

У марту месецу настају велике промене и у природи, и у кошницима. У природи зима пролази, а настаје пролеће, све је више топлијих дана, али су и честе промене времена. Могу настати и изузетно хладни дани. У кошници у гнезду је око 35°C , матица све више полаже јаја. У току марта настаје фаза развоја пчелињег друштва у којој треба да се замене зимске пчеле. До краја марта опада услед тога јачина друштва, јер више пчела угине него што се излаже нових. Поред тога, период око 20. марта, па све до око 25. априла, поклапа се са оптималним периодом припреме пчелињих друштава за багремову пашу: из јаја положених у том периоду излежу се пчеле које ће учествовати у багремовој паши која почине око 10. маја^{**}).

Пчеле које могу да учествују у багремовој паши макар првих 5 дана

^{*}) По питању додавања погаче у фебруару и уопште током године, постоје различита мишљења; једни сматрају да је то добро и потребно, а други сматрају да ако је пчелиње друштво изимљено са дosta меда и полсни, погача је непотребна. Постоји и мишљење да права, квалитетна погача, са максимално инвертованим сахарозом у њој, може само да користи пчелама.

^{**) Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 23.}

легу се из јаја која матица полаже 51 дан пре почетка багремове паше (21 дан-развој ичсле; 30 дана-средња дужина живота пчеле), а пчеле које могу учествовати последњих 5 дана углавној пashi, легу се из јаја која матица полаже 29 дана пре краја главне паше (21 дан-развој пчеле; 3 дана-сазревање пчеле за пашу; 5 дана-учешће углавној папи).

Иначе, у току марта пчелиње друштво нормалне јачине (око 20.000 пчела, око 3 рама легла) троши 3,5-4 пута више хране него у току зимских месеци, троши око 190 g дневно, тј. 5,0-5,5 kg у току овог месеца, због све веће количине легла.

Да би се у багремовој пashi, која започиње око 10. маја, остварили високи приноси меда, у периоду од око 20. марта до око 25. априла, који представља оптималан период за развој пчелињих друштава, потребно је да матица залсже што више легла и то по 1000-2000 јаја дневно. У априлу, када време отопли, када друштво знатно ојача, матица ће имати услове за интензивно полагање јаја. Али у марту, када може да буде и јако хладно, када још увек нема доволно пчела у кошници, матица нема услове за интензивно полагање јаја. Зато баш тада, у марту, пчелар може и мора да помогне пчелињим друштвима. Та помоћ се састоји у обављању нарочито следећих послова:

- изузетно добро утопљавање пчелињих друштава почетком марта,
- први пролећни преглед (чиšћење подњаче, процена јачине друштва, сужавање гнезда, постављање појилице, постављање ваге на пчелињаку),
- контрола количине резервне хране крајем марта,
- додатно утопљавање пчелињих друштава пластичном фолијом у време кад почне да цвета ценарика,
- мало пропиривање гнезда крајем марта,
- стимулативно прихранјивање и аутоматско стимулативно прихранјивање друштава крајем марта.

2.3.1. Изузетно добро утопљавање пчелињих друштава почетком марта

Крајем фебруара, односно почетком марта, додатним изузетно добрым утопљавањем пчелињих друштава, пчелар помаже пчелињем друштву да успешно одржава температуру око 35°C у гнезду и поред нестабилног времена у спољној средини. Ако пчелар не би тада добро утоплио пчелиње друштво, при свакој промени времена дошло би до промене температуре у гнезду и до захлађења легла, јер још увек нема у кошници доволно пчела да би се легло успешно покрило и заштитило од хладноће.


2.3.2. Први пролећни преглед

Први пролећни преглед се врши на температури преко 12°C . Кошница се отвара, али се рамови са леглом не ваде.

Чишћење подњаче је први посао у то доба године. То је за пчелара мали посао, али је пчелама то велика помоћ. Ако је претходне јесени на под кошнице стављен тер-папир или чвршћа фолија, њиховим вађењем из кошнице, подњача остаје чиста, а са тер-папира (или фолије) може да се "прочита" како је друштво зимовало.

Процена јачине друштва врши се на основу следећих запажања (слика 2.9):

- ако пчеле густо покривају прску 7-8 рамова са пчелама, друштво је средње развијено, и уколико даљи развој тог друштва буде нормалан, оно ће остварити високе приносе меда,



Слика 2.9. Стапање јачелињег друштва код првог раног пролећног прегледа (почетком марта): а. јчеле густо запоседају преко 10 рамова; б. јчеле запоседају 7-8 рамова, а доњи наставак је празан; в. јчеле запоседају 7-8 рамова са јчелама у једном наставку; г. јчеле зазимљене у једном наставку, запоседају 5-6 рамова са јчелама; д. јчеле запоседају 4 и мање рама са јчелама

- ако пчеле покривају 5-6 рамова са пчелама, оно може да оствари запажене приносе меда у главној паши, поготово ако се појача са 1-2 рама легла у воћној паши,

- ако пчеле покривају само 4 и мање рама са пчелама, друштво је слабо и од њега не треба очекивати високе приносе меда, али оно може да буде веома корисно помоћно друштво, за појачавање средњих и јаких друштава пред главну пашу.

Јаком друштву, на слици 2.9. под а., очигледно није неопходна помоћ. Ако је то друштво добро утопљено, ако има дosta хране, нипшта му не може нашкодити у току марта. Друштво на слици 2.9. под б. нако је средње јако, поред утопљавања одозго, много би лакше одолевало могућим честим променама спољне температуре, односно, лакше би одржавало потрошну температуру у гнезду, ако би се уклонио празан наставак у рано пролеће. Тада би то друштво имало исте услове за развој као и друштво на слици 2.9. под в.

Код првог прегледа врши се сужавање гнезда и помоћу прсграђне даске, на број запоседнутих рамова са пчелама. Друштвима, као што су друштва приказана на слици 2.9. под б., в. и г., сужавањем гнезда, легло би се повећало, јер су тада услови за интензивније полагање јаја знатно бољи. Пчеле тада добро покривају све рамове у гнезду и тимс лакше обезбеђују потребну топлоту у гнезду за развој легла.

Друштво на слици 2.9. под д. које запоседа 4 и мање рама са пчелама, ако се добро не утопли, ако му се не сузи гнездо и ако се исстави најбоље друштво преко замржене подне даске, тешко да ће дочекати воћну пашу.

Иначе, сужавање гнезда се врши у рано пролеће, почетком марта, кад је време по правилу нестабилно и још увек прохладно, а има за циљ да се пчелама помогне да лакше одржавају топлоту у гнезду до почетка цветања ценарице. При сужавању гнезда рамове са по мало меда треба стављати иза прсграђене даске. Пчеле ће мед из тих рамова кад отопли преносити изнад гнезда.

Ако се почетком марта пчелиње друштво добро утопли, ако му се сузи гнездо, ако му се дода оплемењена погача (као стимултивно средство за интензивнији рад матице), тада се може констатовати да је пчеслар много помогао пчелињем друштву да успесно пребрди март месец, један од најкритичнијих периода у њиховом развоју. А да је март месец заиста један од најкритичнијих периода у развоју пчелињег друштва свесдохи следећа чињеница: у току марта, нарочито у првој половини месеца, број пчела у кошници опада, јер више изумира зимских пчела, него што је прилив младих пчела.

Добрим утопљавањем друштва, сужавањем његовог гнезда и додавањем оплемењене погаче, такво друштво ће се брже развити, односно, брже ће се извршити замена зимских пчела новим, младим пчелама. Практично, циљ је да се до краја месеца марта обезбеди већи прираштај младих пчела од губитка зимских пчела, чиме се стичу услови да се пчелиње друштво у воћној паши увећа 3-4 пута и да се интензивно развија у јако друштво за главну пашу.

Код првог прегледа пчела треба поставити и појилице за пчеле на пчелињаку, као и контролну вагу.

2.3.3. Припрема за развој друштва у оквиру оптималног рока развоја за багремову пашу

Већ је наведено да оптимални период припреме пчелињих друштава за багремову пашу почиње на око 51 дан пре почетка багремове паши. То значи, ако се багремова паши очекује око 10. маја, период припреме за ту паши започиње око 20. марта. Из јаја положених од око 20. марта до око 25. априла излећи ће се пчеле које ће у багремовој паши бити сабирачице.

Да би матица интензивно полагала јаја од 20. марта па надаље, не може

е даске,
друштва
и пове-
Пчеле
потре-

елама,
најко-
ашу.
та, кад
да се
стања
љати
осити

сузи
во за
много
иј од
један
дећа
ла у
илив

јава-
рже
што,
јела
во у
о за

чи-

ја

за
го
ту
то
че

се више кишита учинити, осим онога што је претходно наведено (добро утопљавање, сужавање гнезда, додавање оплемењене погаче).

2.3.4. Контрола минималне количине резервне хране крајем марта

Крајем марта (свентуално почетком априла) кад цвета ценарика, кад је температура преко 10°C , може се отпочети са стимултивним прихрањивањем пчелињих друштава оплемењеним пчелијим сирупом. Али, пре тога потребно је утврдити да ли друштво има минимум 8 kg резервне хране. Уколико је нема, мора се хитно додати (ударним дозама) пчелији сируп¹⁾. Уколико неко друштво нема наведени минимум резервне хране, стимултивно прихрањивање нема смисла. Ако пчелиње друштво има најмање по 1 kg меда по улици пчела може се очекивати његов складан пролећни развој.

Такође треба знати да у ово доба године јачина друштва директно зависи од количине перге у колоници, јер за одгајање 10.000 ларви утропи се око 1 kg полена. Ако неко пчелиње друштво нема доволно полена у ово доба године, знатно ће се успорити развој таквог друштва. Због тога, додавање оплемењене погаче, са састојцима који замењују полен, може много да помогне развоју пчелињег друштва, док се не појави у природи поленова паша. Ипак, треба имати у виду да не постоји права замена за полен.

2.3.5. Додатно утапљавање друштава пластичном фолијом када цвета ценарика

Додавањем пластичне фолије директно преко сатоноша плодишта постижу се два циља: спречава се губљење топлоте из плодишта, што убрзава развој легла, и обезбеђује се квалитетна вода за пчеле од кондензоване паре из пчелињег друштва.

2.3.6. Мало проширење гнезда кад цвета ценарика

Крајем марта, са свим мерама које је пчелар предузео, треба очекивати да је пчелиње друштво успешно пребродило своју критичну фазу развоја када је више зимских пчела угинуло него што се младих, нових пчела излегло. Крајем марта треба очсиковати да је прираст младих пчела већи од страдања зимских пчела. Тада добро развијено друштво већ има легла на 3-4 рама, површине $1\text{-}2 \text{ dm}^2$. Али, још увек постоји потреба за даљи, интензивнији

¹⁾ Пчелиње друштво никада не сме да остане са мање од 8 kg резервне хране, јер, ако се то деси, друштво ће доживети стрес, знатно ће успорити развој, пчеле у таквом друштву краће живе и мање су витални; без обзира што ће се таквом друштву додати храна, од њега ће треса очсиковати високи привосе.

внији рад матице. Међутим, баш тада, када је унос исктара и полена обилан (јер је ценарика цветала), матица бива блокирана рамовима полена до легла, које она не може да прескочи да би дошла до рамова са празним радиличним саћем. Ако пчлар не прискочи у помоћ, и не повуче лево и десно рам са поленом за по један рам, да би се између рама са поленом и леглом убацио рам са извученим саћем, матица ће чекати 5-7 дана да се излегу пчеле из централних рамова да би матица у њих полагала јаја.

Да не би матица губила драгоцено време за полагање јаја, практично, мало проширење гнезда врши се на следећи начин: рам до зида, прво са једне стране, (са медом или празан) спусти се у доњи наставак (ако доњи наставак постоји), или се склони у помоћно друштво, повуку се сви рамови до зида закључно са поленом, и између рама са поленом и леглом убаци се рам са радиличним саћем, румен као јабука, из кога су се излегле 2-4 генерације пчела, претходно испрскан топлим сирупом. Кроз 3-5 дана исти поступак се понови са друге стране кошнице. Овај поступак процређивања гнезда је велика помоћ пчелама, јер пчелиње друштво улази у воћну пашу са најмање 1-2 рама легла више него да није вршено проширивање легла. А то није занемарљиво за ово доба године.

2.4. Пролећни развој пчелињих друштава

АПРИЛ

У априлу, за разлику од критичне фазе развоја пчелињег друштва у марта, када је требало достићи (крајем марта) критичну тачку када излешање нових пчела превазилази број страдалих пчела, у наредној фази развоја друштва, у воћној паши, очекују се још већи резултати:

- пчелиње друштво треба још интензивније да се развија и да нарасте за 3-4 пута, а то значи, да у том периоду достигне своју пуну зрелост, да што пре постане биолошка и организациона целина, са око 20-25 хиљада пчела, које је спремно да у потпуности опслужује једну матицу и да обезбеди даљи интензиван развој друштва за главну пашу;
- с обзиром да се овај период интензивног развоја друштва поклапа са оптималним роком припреме пчелињих друштава за багремову пашу, јер ће се из јаја која матица положи до око 25. априла излећи пчеле сабирачице у багремовој паши, у овом периоду треба учинити све што је могуће да матица има услове за интензивно полагање јаја,
- само оно пчелиње друштво, које што пре (пре багремове паше) достигне своју пуну зрелост (са 20-25 хиљада пчела) има услове за даљи још интензивнији развој стварањем вишке младих пчела, тако да ово друштво може да нарасте до 60-65 хиљада пчела до почетка багремове

паше,

- пчелиња друштва која пре багремове паше не достигну 20-25 хиљада пчела, за време багремове паше немају развијен нагон за сакупљање нектара.

Према томе, задатак је пчелара, да у датим временским условима, омогући пчелињем друштву у априлу да што пре достигне своју биолошку и организациону зрелост и целину (са 20-25 хиљада пчела), да би се тиме створили услови за нарастање друштва на 60-65 хиљада пчела до почетка багремове паше, тј. да се до наoko 15 дана до почетка багремове паше (до око 25. априла) у јаком пчелињем друштву обезбеди да матица залеже око 10 рамова са леглом из којих ће се излсчи око 60.000 пчела-сабирачица у багремовој паши.

Треба истаћи да пчелиње друштво нормалне јачине у току априла потроши око 300 g меда дневно (око 9 kg). То треба да буде упозорење пчелару да, уколико у воћној паши не буде меда, мора друштва да прихрањује.

У априлу пчелара очскује пуно значајних послова на пчелињаку, а нарочито:

- стимулативно прихрањивање и аутоматско стимулативно прихрањивање пчелињих друштава,
- мало проширивање гнезда почетком априла,
- велико проширивање гнезда,
- селекција пчелињих друштава,
- проширивање простора у кошници,
- додавање полунаставака у воћној паши изузетно јаким друштвима,
- уклањање материјала за утопљавање,
- прихрањивање пчелињих друштава у безлашном периоду, после воћне паше,
- спречавање појаве ројевог нагона,
- припремање пчелињих друштава за главну - багремову пашу.

2.4.1. Стимулативно прихрањивање и аутоматско стимулативно прихрањивање пчелињих друштава

Крајем марта (почетком априла), када цвета џенарика, кад отопли (кад је дневна температура преко 10°C), стимулативним прихрањивањем оплесменјеним шећерним сирупом, дневно по 200-300 g, знатно се убрзава развој друштва. У ово доба године (слично као у току августа) за интензиван развој друштва битно је да храна стално притиче, било споља уносом нектара, било изнутра, прихрањивањем (сируп, погача). Оплемењена погача, дodata у ово доба године, такође је изузетно добра као стимулативно средство за развој друштва.

Аутоматско стимулативно прихрањивање је најбоље и најsigурније за успешан развој пчелињих друштава. Оно се састоји у следећем:

- Крајем марта (почетком априла) поставити полунаставак, са медом, испод плодишта. Пчелс ис трпе мед испод легла, па ће због тога отварати мед из полумедицита и преосити га изнад легла. То ће створити у кошници "утисак" као да је обилна паша и унос нектара споља, те ће и пчеле и матица интензивно радити на бржем развоју друштва: матица ће интензивно полагати јаја, а пчеле ће обилно храинити и неговати легло.

- Не могу сви пчелари да обезбеде полумедиците са медом (испод плодишта), али могу, почев од првог априла, па све до наoko 15 дана до багремове папе, да отварају мед на рамовима са медом до легла (површине 1-2 dm²) сваких 5-7 дана. Пчелс ће тај мед брзо преносити изнад легла. То преношење меда са рамова са медом до легла стимулисаће и пчеле и матицу на интензивнији рад.

- Окретањем прво по једног рама са леглом у централном делу гнезда за 180°, па кроз 5-7 дана заокретањем 2 рама са леглом за 180°, затим заокретањем целог плодишта за 180°, постиже се изванредно аутоматско стимултивно прихранјивање пчелињег друштва^{*)}. Код рама са леглом, у ово доба године, легло се илази на предњем делу рама, до лета. Заокретањем наставка-плодишта или рама са леглом за 180°, легло ће се наћи на супротној страни од лета. Између легла и лета налазиће се мед. Познато је да пчеле не трпе мед између легла и лета, па ће оне убрзао сав мед између легла и лета преносити изнад легла, и очистити ћелије које ће матица убрзо зарећи јајима.

- Замсном места два плодишна наставка (делокацијом легла, цепањем легла) такође се постиже интензиван развој друштва.

2.4.2. Мало проширивање гнезда Јошетиком априла

Почетком априла, односно 5-7 дана после малог пропирења гнезда које је извршено крајем марта, потребио је урадити следеће:

- извршити друго мало проширивање гнезда, додавањем рама са квалиитетним радиличним саћем до легла,
- окренути 1-2 рама са леглом у централном делу гнезда за 180°,
- отворити мед на раму до легла површине 1-2 dm²,
- наставити са стимултивним прихранјивањем пчелињег друштва до давањем оплесменског сирупа (200-300 g дневно, 1:1), или додавањем оплесмене погаче. Ако се испод плодишта илази полунаставак са медом, код таквог друштва не треба вршити стимултивно прихранјивање, јер ће пчеле саме из полунаставка односити мед горе, изнад легла, и на тај начин вршити такозвано аутоматско стимултивно прихранјивање.

^{*)} С обзиром да је у ово доба године променљиво време, сигурније је да се цело плодиште окрене за 180°, јер ваћењем рамова са леглом (да би се заокренуло за 180°) може доћи до захлађења (прехладе) легла.

2.4.3. Велико проширивање гнезда

У првој половини априла, кад цвета трешња, маслачак, кад легла има на 5-6 рамова, потребно је урадити следеће:

- извршити велико проширивање гнезда додавањем 1-2 рама са сатном основом која се претходно испрска топлим сирупом,
- додати рам - грађевњак,
- извршити друго отклапање меда на раму до легла, површине $1-3 \text{ dm}^2$,
- заокренuti 2-3 рама са леглом за 180° у центру гнезда, или заокрепнути цело плодиште за 180° , ако је топло време.


2.4.4. Селекција пчелињих друштава

Почетком цветања јабуке обавити следеће послове:

- поново извршити велико проширивање гнезда додавањем 1-2 рама са сатном основом,
- заокренuti 2-3 рама са леглом у центру гнезда за 180° , или цело плодиште, ако је топло време,
- отворити мед на раму до легла површине $2-3 \text{ dm}^2$,
- додати рам (или полурам) - грађевњак пчелињим друштвима која имају 5 и више рамова са леглом,
- извршити селекцију пчелињих друштава на друштва која ће бити производна, која ће донести мед, и на помоћна друштва, која неће донести мед.

Јака пчелиња друштва тада имају легла наоко 6-7 рамова, средња наоко 4-5 рамова и слаба на 3 и мање рама.

Пре селекције пчелињих друштава прво се утврди стање друштава на пчелињаку. Нека је нађено стање на пчелињаку као на слици 2.10.




Слика 2.10. Стапање пчелињих друштава половином априла, пре селекције

Из приказаног стања на слици 2.10. очигледно је да ће производна друштва бити само она која имају 5 и више рамова са леглом. Пчелиња друштва са 4 рама са леглом могла би да учествују у главној паши под условом да им се дода по један рам са леглом из оних друштава која немају

никакве шансе да се развију до главне паше. То су пчелиња друштва са 3 и мање рама са леглом.

Значи, пчелиња друштва на слици 2.10. под бројем 1, 4 и 6 су добра, и она ће се до багремове паше развити у производна друштва. Пчелиња друштва под бројем 2 и 3, са по 4 рама са леглом, да би била јака производна друштва, морају се појачати са по једним рамом затвореног легла из слабијих, помоћних друштава која су приказана на истој слици под бројем 5 и 7. Пчелиње друштво под б је изузетно добро, јер има 7 рамова са леглом. Било би веома добро ако би на пчелињаку у ово доба године било што је могуће више оваквих друштава.



Слика 2.11. Срушење пчеличних друштава посље селекције

Стање пчеличних друштава после селекције и појачавања њихових производних друштава дато је на слици 2.11.


После наведене селикције пчеличних друштава на пчелињаку потребно је и даље предузимати мере да се пчелиња друштва интензивно развијају (стимулативно прихрањивање, заокретање рамова са леглом или целог плодишта, додавање рамова са сатним основама, и др.).

2.4.5. Проширивање простора у кошници

После извршене селекције пчеличних друштава, уза све наведене мере за интензиван развој пчеличних друштава, убрзо, срдином цветања јабуке, плодиште је пуно пчелама: већ има 9-10 рамова са пчелама и 6-7 рамова са леглом, последњи рамови се пуне пчелама. Кад се плодиште погледа одозго, све се бели од меда. Тада је, по правилу, матица блокирана, у плодишту нема места за полагање јаја, сви рамови су пуни легла и меда. То је прави тренутак када пчелар треба и мора да прискочи у помоћ пчелама и да прошири плодиште. То се може учинити на два начина.

Први начин се односи на пчелиња друштва зазимљена у два наставка (горе плодиште, доле празан наставак) код којих се врши замена места наставака: плодиште иде на подњачу, а доњи наставак изнад плодишта (слика 2.12.).

Овом заменом места наставака отклања се велика тескоба у плодишту, обезбеђује се простор матици за полагање јаја, јер ће матица убрзо прећи у горњи наставак у коме је топлије и у коме има пуно слободног радиличног саћа за полагање јаја. Ако се код замене места наставака пребаци из плодишта 2-3 рама са леглом и пчелама у горњи празан наставак (не водећи рачуна где је матица), матица ће истога дана прећи у горњи наставак (слика 2.13.).



Слика 2.13. Превешавање 2-3 рама са леглом из плодишта у празан горњи наставак


као да је обilan унос исктара, што поспонираје и матицу и пчеле на још интензивнији рад.

Може се оправдано поставити питање: шта ће се десити ако пчелар на време не замени места наставцима? У том случају матица ће сама прећи у доњи наставак, на оних 4-6 рамова са квалитетним радиличним саћем, који су стављени у току августа. Али, матица ће то учинити са закашњењем од 3-5 дана, а за то време могла би матица да спесе око 6.000 јаја из којих се легу сабирачице за багремову пашу.

Даље се може поставити питање: да ли је обавезна замена места наставака, или се деблокада матице, тј проширивање простора плодишта, може урадити и на други начин.

Многи искусни пчелари не врше замену места наставака, нарочито ако је у то доба године прохладно врсме (што је иначе чест случај у априлу у напем поднебљу), већ настоје да матица буде увек у горњем наставку, где јој је топлије, а проширивање простора за полагање јаја чине на следећи начин:


- Кад у горњем наставку пчеле пуне последње рамове, кад је 6-7 рамова са леглом, спусти се из горњег наставка (плодишта) у доњи наставак 1-2 рама са медом, повуку се у плодишту рамови до зида конвиције, са леве и десне стране легла, да би се до легла (са обе стране) додао по један рам са



Слика 2.12. Замена места плодишта и наставака

извученим саћем или сатном основом, који су претходно испрскани топлим сирупом. Кад пчеле извку саће у додатим сатним осовама и кад матица залегне додато саће, поново се пресврпају из горњег наставка у доњи наставак, ие само рамови са мсдом, већ и рамови са затвореним леглом. Ипак, замена места наставака је ефикасација за интезиван развој друштва.

Кад се замене места наставцима, матица ће опет искористити сав слободни простор у горњем наставку за полагање јаја и убрзо ће, кроз 7-10 дана, опет горњи наставак бити пуни пчелама и леглом. За то време у доњем наставку, бивши плодишту, из одређеног броја рамова са леглом излегле су се пчеле, које ће у неке такве празне рамове уносити полен, а неки од ових рамови ће остати празни. Понто је сада горњи наставак поново пуни пчелама и леглом, тескобаи је за пчеле и матици, матица ће прећи у доњи наставак, али тек кроз 3-5 дана. Међутим, благовременом замениом наставака поново се пчелиње друштво стимулише за иинтезиви развој, а матица за иинтезивио полагање јаја (слика 2.14).



Слика 2.14. Замена места наставака: I - средином цвећања јабуке (половина априла); II - крајем цвећања јабуке; III - на око 15 дана до багремове паше




Слика 2.15. Пчелиње друштво у једном наставку

са леглом. При томе могу настати неколико карактеристичних ситуација:


- Ако је време топло, додаје се наставак изнад плодишта (слика 2.16.). Да би матица што пре прешла у горњи наставак, из плодишта се пребаци 2-3 рама са леглом и пчелама у горњи наставак, а иа њихово место се стави 2-3 рама са извученим саћем (слика 2.17.);

Други начин састоји се у томе да се дода други наставак пчелињим друштвима која су зазимљена у једном наставку (слика 2.15.), (или су била зазимљена у два наставка, а почетком марта им је склоњен доњи наставак), кад достигну развој са 9-10 рамова са пчелама и 6-7 рамова




Слика 2.16. Додавање наставака изнад плодишта

Ако је време хладно, додавањем наставка изнад плодишта расхлади-ло би се легло, и зато је сигурије да се испод плодишта подметне наст-авак са рамовима са извученим саћем (слика 2.18.). У доњи подметнути на-ставак се тада спусти 2-3 рама (са медом) из плодишта (до зида а на вицова се повуку остали рамови у плодиниту, да би се до легла са обе стране ставио по један рам са изву-



Слика 2.18. Додавање наставака испод плодишта



Слика 2.17. Превешавање 2-3 рама са леглом у додати наставак

ченим саћем или сатном основом. Чим време дозволи, треба извршити замену места наставака. Добро је да се у додатом наставку међу рамови-ма са извученим саћем нађе по неки рам са мало мёда. Ако има уноса нектара, у плодиште се у ово доба године може додати 2-3 рама са сатним основама.

2.4.6. Додавање полунаставака у воћној паши изузетно јаким друштвима

Услови пчеларења се знатно разликују од једног до другог региона. Чак под истим поднебљем, у истој широј околини, у једном крају, воћна паша може да буде веома издашна, а да у суседном крају то није случај. Због свега тога није могуће дати прецизна упутства за сваки регион када треба тачно обавити одређену фазу пчеларења. Зато пчелар мора сам, полазећи од наведених општих упутстава, да процени кад и како обавити одређену фазу пчеларења.

Тако, на пример, може се десити да јако пчелиње друштво у воћној паши, за време цветања јабуке, веома брзо напуни пчелама и лег-лом оба плодишна наставка и да му је потребно дадати нови, трећи на-ставак. Али, ако му се дода ћо на-ставак, може да дође до расхлађења легла. Због тога је знатно сигурије додати полунаставак изнад другог



Слика 2.19. Додавање полунаставака у воћној паши

наставка (слика 2.19.), јер се на тај начин најмање расхлађује легло и најмање ремсти микроклима у пчелињем друштву.

Додати полунаставак у ово доба године служи, поред већ реченог, да се у њега смести свентуални вишак нектара, воћни мед, чимс се матица у плодишту знатно мање блокира. Поред тога, полунаставак служи да прихвати пчеле. Пчеле врло брзо и веома ради нектаром иуне полунаставак и на тај начин одвлаче знатан број пчела из плодишта, услед чега се добрим делом слименише појава ројсвог нагона у друштву.

Ако би се у то доба године додао цео наставак, пчелс би тешко прешиле у тај додати наставак и због тога морало би да се превеша 1-2 рама са леглом и пчелама из плодишта у тај наставак. Зато је полунаставак право решење.

2.4.7. Скллањање материјала за уточиљавање

Кад се стабилизује температура у природи и кад се плодиште (у једном наставку) налуни пчелама и леглом, може се склонити материјал који је коришћен за уточиљавање пчелињег друштва. Ако је година са честим ироменама температуре, пожељно је да материјал за уточиљавање пчелињег друштва остане у кошници до почетка багрсмове паше. Најсигурније је да материјал за уточиљавање остане у кошници до на око 15 дана пред багрсмову пашу (приближно до 25. априла), када су друштва довољно јака да могу сама да се заштите од изненадних захлађења.

2.4.8. Прихранјивање пчелињих друштава у безданском периоду, после воћне паше

Најчешће, после воћне паше нисма никаквог уноса нектара и настаје беспашни период све до багрсмове паше. Пчелиња друштва су тада доста јака, матица има доста простора за полагање јаја, али да би она интензивно и даље полагала јаја, мора и даље да постоји или унос нектара, или да се користи храна из кошнице прихранјивањем. Најбоље је да се у том периоду пчелињим друштвима додаје погача, или речи шећерни сируп (1:2, 1:3).

2.4.9. Спречавање појаве ројевог нагона


Познато је да ако се појави ројеви нагон, нисма високих приноса меда. Такође је познато, да када се појави ројеви нагон кидање матичњака не даје скоро никакве резултате. Значи, борба против појаве ројевог нагона може да буде успешна једино ако се предузму превентивне мере да до појаве ројевог нагона не дође. Да би се предузеле превентивне мере против појаве ројевог нагона, требало би претходно знати кад све долази до њего-

ве појаве. Наводе се неколико основних разлога због којих се јавља ројеви нагон:

- када у плодишту младе пчеле немају доволно посла, јер је за постојање отворено легло доволно, на пример, 2-3 младе пчеле по једној ларви, а њих у добро вођеној паши може да буде преко 5 по једној ларви, очигледно је да ће тај вишак младих незапослених пчела бити узрок појаве ројевог нагона, уколико се што пре не запосле. Да би се младе пчеле запослиле, веома је битно да се у вођеној паши, а и касније, одржава равнотежа између затвореног и отвореног легла. С тим у вези код јаких друштава треба благовремено превешавати затворено легло у медишите, а на место затвореног легла треба давати сатне основе, грађевињак, и слично,

- када у јаком друштву нема доволно простора за легло, долази до појаве ројевог нагона и због тога је веома битно благовремено проширивање простору у кошници додавањем новог наставка, заменом места наставака (ако је друштво у два наставка) и друго,

- до ројевог нагона долази ако је у плодишту саће неквалитетно, извртоперсено, трутовско, чиме се смањује простор за легло, затим, ако је вентилација у кошници лоша, ако је растојање између рамова у кошници знатно мање или веће од 11 mm, ако је стара матица, итд.




Слика 2.20. Спремање ројевог нагона уметањем једног наставка или наставака између два плодишна наставака

Ипак, ако се примете први знаци ројевог нагона (извлачење матичних основа и сл.), може се спречити ројеви нагон на следећи начин: у пчелиње друштво развијено у два наставка (слика 2.20. под а.) између два плодишна наставка убаци се наставак (слика 2.20. под в.) или полунаставак (слика 2.20. под б.) са рамовима са извученим саћем и сатним основама, водећи рачуна при томе да се наставак са матицом увек нађе на подњачи.

Ако се код пчелињег друштва (слика 2.21. под а.) ројеви нагон знатно развио (мноштво затворених матичњака), најсигурније је учинити следеће: у наставку на подњачи оставити матицу са 1-2 рама са отвореним леглом, а све остало легло пренести у горњи наставак, а између доњег и горњег наставка поставити матичну решетку (MP) (слика 2.21. под б.). Још је сигурније ако се изнад матичне решетке стави полунаставак или наставак са рамо-

вима са извученим саћем и сатном основом (слика 2.21. под а.). Најсигурније решење је ако се матица са 1-2 рама са отвореним леглом задржи у наставку на подњачи, а изнад њега се постави наставак са осталим леглом преко подне даске (ПД) (слика 2.21. под г.). Ако у то доба године има уноса нектара, постави се полумедиште или медиште као на слици 2.21. под д.



Слика 2.21. Начини сречавања ројевог нагона

Очигледно је да ће изнад подне даске остати само младе пчеле, које ће ускоро саме уништити све матичњаке, сем 1-2 најбоља, из којих ће се излешти млада матица.

2.5. Припрема пчелињих друштава за главну (багремову) пашу

Припреме за багремову пашу обављају се на око 15 дана пред багремову пашу, око 25. априла.

Све до тог тренутка циљ је био да се пчелиња друштва развију максимално, са пчелама у два наставка и са леглом на најмање пуних 10 рамова. Од тог тренутка, циљ је да што већи део кошице буде медиште, са једис стране, а са друге стране, да матица и даље интензивно полаже јаја, тј. да има довољно простора за полагање јаја, а да при томе не дође до појаве ројевог нагона у кошници.

У овом поглављу детаљно ће се објаснити како се припремају за багремову пашу пчелиња друштва која су се максимално развила до око 25. априла. Међутим, све је чешћи случај у нашим климатским условима да се до око 25. априла пчелиња друштва недовољно развију, тако да немају најмање 10 пуних рамова са леглом. Таква друштва неће имати у багремовој паши 60-65 хиљада пчела и зато неће моћи да остваре високе приносе меда.

Да би пчелиње друштво остварило високе приносе у багремовој паши, мора да уђе у багремову пашу са 60-65 хиљаде пчела, тј. мора на око 15 дана до багремове паше да има најмање 10 рамова са леглом. Међутим, ако пчелиње друштво нема најмање 10 рамова са леглом, недостајућа количина му се додаје из помоћних друштава, нуклеуса, водећи рачуна да додата

котичина легла не износи више од 20%. То, другим речима значи, да има смисла додати пчелињем друштву 1-2 рама са затворским леглом ради његовог појачања, али не више од тога.

Било да је пчелиње друштво само достигло најмање 10 рамова са леглом на око 15 дана до багремове паши, било да му је тада додата недостајућа количина легла из помоћних друштава, нуклуса, следи изузетно важна припрема друштава за главну (багремову) пашу, да би се при томе остварила истовремено два циља:

- први, да матица и даље интензивно полаже јаја, и
- други да не дође до појаве ројевог нагона.

Оба ова циља могу се постићи:

- превешавањем (демарирањем) легла из плодишта у медишите,
- додавањем трсћег наставка између два плодишна наставка, или
- премештањем плодишта са подњаче у горњи наставак.


2.5.1. Превешавање легла из плодишта у медишта, око 25. априла

Ако се пчелиње друштво складно развијало, оно се око 25. априла развило у два наставка (слика 2.22.) и тада је матица, по правилу, у горњем наставку.


Међутим, за сваки случај, око 3-4 дана пре превешавања легла може се поставити матична решетка између два плодишна наставка, да би се на дан превешавања утврдило, по отворском леглу, у ком наставку је матица.

Поступак превешавања легла је следећи:

- помери се пчелиње друштво лево-десно са подњаче,
- на подњачу се стави празан наставак (3) у који се из плодишта пренесе матица са рамом отвореног легла на коме се пронађе матица, и још један рам са отвореним леглом и пчелама. Затим се лево и десно од два рама са отвореним леглом стави по један рам са сатном основом (PCO) и по два рама са извученим саћем (РИС), лево и десно од рама са сатном основом. На крају, до зида кошнице, дода се по један рам са медом и поленом,
- на тако формирани наставак (3) на подњачи, ставља се матична решетка (MP), а на матичну решетку ставља се наставак са прстежно отвореним леглом (РОЛ), а изнад њега као трсћи наставак, наставак са прстежно затвореним леглом (РЗЛ) (слика 2.23.).



Слика 2.22. Пчелиње друштво пре превешавања легла



Слика 2.23. Пчелиње друштаво после превешавања легла

Матица, макар била изузетно квалитетна, за то време једва може да положи јаја у наведених 6 рамова; значи, матица има простора за интензивно полагање јаја.

Кад багрем креће (око 10. маја), у плодишту се налази: 4 рама са затвореним леглом (то су она 4 рама са извученим саћем), 2 рама са затвореним леглом из којих излазе младе пчеле (то су она 2 рама са отвореним леглом на око 15 дана пред багремову пащу), 2 рама са отвореним леглом (то су она 2 рама са сатним основама) и 2 рама са медом и поленом.

За врсмес багремове паши у плодишту је 6-8 рамова са леглом, а од тога само 2 рама са отвореним леглом. За негу овог легла биће ангажовано мало младих пчела. Највећи број пчела биће ангажовано у главној паши.

У медишту, у наставцима изнад плодишта, неће више бити легла, јер су се из њега већ излегле пчесле. Дакле, у плодишту има доста празног радиличног саћа и матица може да положе јаја колико хоће, а у медишту има доста простора за мес. У плодишту је углавном све саће квалитетно и ново. Радно расположење и матице и пчесле је на висини. Нема тескобе ни у плодишту, ни у медишту, што представља битан услов да би се избегао ројеви нагон, а развио сакупљачки нагон у главној паши и остварили високи приноси меда.

Код овог поступка пчеларења очигледно је да матична решетка игра важну улогу.

2.5.2. Додавање трећег наставка између два плодишна наставка


На крају воћне паши, око 25. априла, оба плодишна наставка су пуне пчелама и леглом (слика 2.24.). Легло се налази у оба наставка: у првом наставку на подњачи је, по правилу, затворено легло, а у другом је претежно отворено легло. Тада је право време да се прошири простор матице за полагање јаја, да се деблокира матица, тј. да се прошири простор у кошни-

Шта се поступком превешавања (демарирања) легла постиже?

У плодишту, у коме је матица, матици је до багремове паши на располагању 4 рама са извученим саћем и 2 рама са сатном основом. Док младе пчесле буду извлачице 2 рама са сатном основом, матица ће полагати јаја у 4 рама са извученим саћем. До багремове паши (за око 15 дана) матица има за полагање јаја на располагању 6 рамова, а то је до врсно за око 35 хиљада јаја.


ци, да се спречи евентуална појава ројевог нагона додавањем трећег наставка између два плодишта. Код поступка проширења простора у кошници и припреме пчелињих друштава за багремову пашу потребно је учинити следеће:

- поставити матичну решетку између првог и другог наставка, да се након 3-4 дана види где је матица, да би се наставак са матицом поставио на подњачу. По правилу, матица би требало да буде у другом наставку, па ће се заменом места наставака, она наћи на подњачи (слика 2.25.),



Слика 2.25. Замена места наставака да би се майница нашла у наставку на подњачи

упошљавање младих пчела на неговању легла и извлачењу сатних основа. Непосредно до пред багремову пашу, и у багремовој пashi, у доња два плодишна наставка (2 и 3), матица ће имати довољно простора за полагање јаја (слика 2.26. под а.).




Слика 2.26. Додавање трећег наставка између два плодишна наставка



Слика 2.24. Пчелиње друштво на крају воћне паше (око 25. априла)

- када се обезбеди да је матица у наставку на подњачи, тада се на наставак са матицом додаје наставак или полунаставак (3) са 3-4 рама са сатном основом, 2-3 рама са по мало меда и полена, а остало су рамови са извученим саћем (слика 2.26. под а.).


Пошто матица више нема места за полагање јаја у наставку на подњачи, врло брзо ће прећи горе, у новододати наставак, у коме има обиље простора за полагање јаја и за



Слика 2.27. Додавање новог настакавац пре багремовој паше


У багремовој паши, ако је потребно, додаје се медиците изнад плодишних наставака (наставак 5) (слика 2.28. под а.), с тим што се у међуврсмену може горњи наставак пун меда (1) скинути са кошнице и однети на врдање (слика 2.28. под б.).

Ако се после багремове паше не иде на неку близку пашу (багремац и др.), већ се иде на сунцокретову пашу, онда је боље да се искористи што више багремова папла, па се у том случају плодиште, помоћу матичне репишке, ограничава у доњем наставку на подњачи (слика 2.29.).



Слика 2.29. Плодиште производног друштва у једном настакаву у багремовој паши

Уколико се деси да је друштво изузетно јако и да се до главње паше мора додати и четврти наставак, поступа се на сличан начин као у вези са slikom 2.24. и 2.25., тј. прво се замене места плодишних наставака, да би се матица напила у наставку на подњачи, а затим се између два плодишна наставка дода наставак (4), са рамовима са извученим саћем и сатним основама (слика 2.27. под а.). У багремовој паши у доња два наставка (3 и 4) матица има довољно простора за полагање јаја (слика 2.27. под б.).



Слика 2.28. Производно друштво у багремовој паши


Шта би се десило ако би се трећи наставак додао не између два плодишна наставка, већ директно изнад два плодишна наставка пчелињег друштва, као на слици 2.30.?

Ако би се трећи наставак додао директно изнад другог плодишног наставка, тада би у наставку на подњачи, где је претежно затворено легло, ускоро, кад се из тог легла излегу пчеле, сабирачице у празно саће уносиле полен. Матица иерадо силази у доњи наставак и она ће ускоро морати да пређе у новододати

трећи наставак, јер је у другом наставку већ блокирана. Значи, код оваквог начина додавања трећег наставка, доњи наставак, на подњачи, био би изгубљен за мед. Пчелари који користе пергу за своје или комерцијалне потребе, ваде је из саћа, а овим поступком упрано обезбеђују значајне количине перге (полен) у наставку на подњачи.



Слика 2.30. Додавање трећег наставака
директно изнад плодишићих наставака



Слика 2.31. Додавање трећег наставака
изнад плодишићих наставака

Ако би се трећи наставак поставио изнад два плодишина наставка, али да се претходно замени место плодишиним наставцима, да би се матица нашла у наставку на подњачи (слика 2.31.), матица ће убрзо пресећи у горњи наставак (1) где ће наћи нешто слободних ћелија из којих су се већ излегле пчеле. Сигурно је да је овај начин додавања трећег наставка боли од наведеног на слици 2.30., али знатно лошији од начина приказаниог на сликама 2.26.-2.29.


2.5.3. Премештање плодишића са подњаче у горњи наставак^{*}

Поред припреме пчелињих друштава за багретову пашу око 25. априла, превешавањем легла, или уметањем наставка између два плодишина наставака, у пракси се примењује и метод премештања плодишића са подњаче у горњи наставак, који се састоји у следећем:


- око 25. априла, на око 15 дана до багретове паше, наставак са матицом и са 1-2 рама са отвореним леглом, 2-3 рама са сатном основом, 3-4 рама са извученим саћем и 2-3 рама са медом и поленом, постави се горе, на место трећег наставка. Испод њега, испод матичне решетке, у доња два наставка размести се све остало легло (слика 2.32.). Користи се само доње лето, а сва осталана помоћна лета су затворена. Наравно, ако у кошници нема најмање 10 рамова са леглом, недостајућа количина легла додаје се из помоћних друштава, нуклеуса.

^{*}) Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 28.

Кад замеди, око 10. маја, замени се матична решетка вентилационом мрежом (ВМ) са летом, чиме се све сабирачице усмере доле у медиште на сакупљању нектара. У горњем наставку са матицом остају само младе пчеле (слика 2.33.).



Слика 2.32. Припреме за главну йашу



Слика 2.33. У багремовој јашу

Матица ће у горњем наставку интензивно полагати јаја и друштво ће се нормално развијати. Пчеле ће интензивно уносити нектар у доње наставке (медишта). Преко вентилационе мреже сабирачице ће осећати своју матицу.

После врдања меда, склони се вентилациону мрежу и друштво се среди тако да се матица (плодиште) нађе на подњачи.

2.6. Главна багремова паша

МАЈ

У мају месецу, нарочито у првој половини маја, за сваког пчелара је време стрепње и надања: да ли ће коначно багрем да замеди и да ли ће се кошнице напунити медом. Све што се успешно урадило на зазимљавању и пролећном развоју пчелињих друштава, сада, у мају, у главној багремовој паши треба да се потврди кроз добре приносе меда. Наравно, у мају месецу треба обавити и послове у вези са даљим развојем пчелињака, узгојем матица, вештачким ројењем и др.

Веома значајни послови које у мају треба обавити су:

- контрола и подешавање вентилације у кошници,
- контрола медишног простора и разређивање рамова у медишту,
- узгој матица, формирање нуклеуса, ројева и др.

У оквиру одељка 2.5. детаљно су објашњене и фазе пчеларења које се односе на главну багремову пашу, па се оне овде неће поново разматрати.

2.6.1. Контрола и подесавање вентилације у кошници

Кад багрем замеди, веома је битно да се доње лето широм отвори и да се отворе помоћна лета на медиштима.

Колико је важна вентилација у кошници за време главне паше, најбоље се види из следећег:

- за време главне паше по правилу су високе температуре у природи, а у кошници је много пчела, па уколико вентилација није одговарајућа, долази до ангажовања великог броја пчела на регулисању температуре у плодишту, уместо да се што већи број пчела ангажује на уносу нектара у главној паши,

- од унете количине нектара у кошницу, његовом прерадом добија се тек једна трсћина меда, остало је углавном вода која треба да се одстрани из кошнице. Ако је вентилација у кошници лоша, лако је претпоставити да ће пчеле у изузетно тешким условима вршити прераду нектара у мед.

2.6.2. Контрола медишног простора и разређивање рамова у медишу у главној паши

Веома је битно да се у главној паши благовремено обезбеди довољна величина медишног простора. Из праксе је познато да већи медишни простор у кошници стимулише пчеле на већи унос нектара. Што је већи медишни простор, биће више меда.

Поред тога, треба имати у виду да медишта са 9 рамова, уместо са 10 (медишта са разређеним рамовима), су нарочито рационална у главној паши: за исту количину меса врца се мањи број рамова, добија се више воска итд.

Испод медишта са разређеним рамовима уколико се користи матична решетка, иста се изоставља, јер матица не прелази и не полаже јаја у наставку са разређеним рамовима.

2.6.3. Узгој матице и формирање нуклеуса, ројева

На многим местима у овој књизи је истакнуто да се пчеларењем са једном матицом, по правилу, не могу добити високи приноси меда, и да треба у припреми за главне паше користити технологију пчеларења са две и више матица. Али, одмах треба истaćи да за пчеларење са више матица треба обезбедити доста матица, нуклеуса, ројева на сопственом пчелињаку. То може само онај пчелар који је овладао узгојем матица пресађивањем ларви.

Данас све већи број стручњака из пчеларства сматра да сваки пчелар

треба да савлада технику узгоја матица пресађивањем ларви, како би успешни узгајао матице и формирао сам нуклеус, ројеве. Тада посао треба започети крајем маја и обавити га до краја јуна. Познато је пчеларско правило: у мају и јуну што више разројавати друштва, тј. формирати нуклеусе, ројеве, а доцније, у главним пашама, што више спајати друштва. Овај пчелар који на свом пчелињаку има већи број нуклеуса, најмање један на два производна друштва, успешни може да припреми јака друштва за сваку главну пашу.

ЈУН

У јуну месецу, нарочито у првој половини јуна, врши се врцање меда са једне стране и води се жестока борба, са друге стране, да се пчелиња друштва, која тада доживљавају врхунац свога развоја, не изроје. Поред тога, истовремено се предузимају мере да се одржи снага друштва за наредне паше, да се прошири и ојача пчелињак, итд. Према томе, доста значајних послова треба обавити у јуну, али следећа два су најважнија:

- разрешити проблем шта учинити после багремове паше да се јака друштва не изроје, а да се, истовремено, обезбеди даљи развој таквих друштава за наредне паше,

- припремити пчелиња друштва за сунцокретову пашу.

2.7. Даљи развој пчелињих друштава после багремове паше

Шта учинити после багремове паше, односно после врцања багремовог меда? Одговарајући на ово сложено питање практично се даје и одговор на низ појединачних питања, као што су: како се супроставити великој могућности појаве ројевог нагона; како разројити друштва, а да њихова сакупљачка снага не ослаби; како матицу стимулисати да интензивно полаже јаја, итд.

Значи, крајем багремове паше, односно, одмах пошто се изврца мед, у пчелињем друштву је следеће стање:




- пчелиње друштво је максимално развијено са много пчела сабирачица, а мало легла у колоници,
- у кошници је права тескоба и гужва, јер за тако много пчела нема доволно послса,
- због тога што је у главној паши знатно поремећен однос између легла (којег има релативно мало), и младих пчела (којих има пуно), мноштво младих пчела-неговательница је незапослено. Од око 50 хиљада пчела, колико их тада најмање има у јаким пчелињим друштвима, једва око 20

хиљада пчела опслужује матицу, а све остале пчеле, преко 30 хиљада, су сувише, незапослене.

Управо тај вишак пчела, сабирачица и младих пчела, представља велику потенцијалну опасност за појаву ројевог нагона. Због тога се одмах после багремове паше, тј. после врџања меда, предузимају мере за спречавање појаве ројевог нагона, са једне стране, и за даљи развој пчелињих друштава, са друге стране. То се може постићи на следећа два начина.

2.7.1. Први начин - проширување плодишта и превешавање легла

Одмах после врџања багремовог меда проширује се плодиште, односно, пропиријује се простор матици за полагање јаја, на следећи начин:




Слика 2.34. Стапање друштава крајем багремове паше

Слика 2.35. Стапање друштава после врџања меда

Слика 2.36. Стапање друштава крајем багремове паше

- Ако је у багремовој паши плодиште било у једном наставку, са матичном решетком (слика 2.34.), склана се матична решетка са првог наставка и ставља се изнад другог наставка, да би матица могла да полаже јаја у два наставка (слика 2.35.). Матица ће убрзо прећи у горњи наставак, у коме има пуно празног радиличног, квалитетног саћа;

- Ако је у багремовој паши плодиште већ било у два наставка (слика 2.36.), друштво се преуреди тако да се матица са отвореним леглом ставља у наставак на подњачи, а у другом наставку су рамови са извученим саћем, сатном основом и 1-2 рама са затвореним леглом. Остали рамови са затвореним леглом су у трећем наставку, изнад матичне решетке (слика 2.37. под а.). На потпуно исти начин се поступа ако багремова паша изостане због неповољних временских прилика. Матица ће ускоро развити легло у оба наставка и такво друштво ће бити спремно за наредну пашу, са доста легла и пуно пчела у плодишту које је у два наставка (слика 2.37. под б.).




Слика 2.37. Стапање ћелињег друштва Јосле вртања меда

и наставку, али тада се морају изнад матичне решетке (која је изнад првог наставка) да превешавају рамови са затвореним леглом у медијите, и то по 1-2 рама недељно. На њихова места стављати рамове са сатионом основом.


Ако се после багремове паше иде на поступак превешавања легла из плодишта у медијите, да би се растерстило плодиште од вишке младих пчела, и да би матица имала довољно простора за полагање јаја у плодишту, може се очекивати да ће се такво друштво развити до око 50 хиљада пчела за сунцокрстову пашу (слика 2.39.).

На следећу пашу може се ићи са развијеним друштвом као на слици 2.37. под б., а може се матица блокирати у једном наставку на подњачи, са 1-2 рама са отвореним леглом, 2 рама са сатном основом и то по један са леве и десне стране легла, са 4 рама са извученим сајем (по два са обе стране легла) и са 2-3 рама са медом и полсијом (слика 2.38).

Могућа је и следећа варијанта: да је плодиште пчелињег друштва послес багремове паше било у једном



Слика 2.38. Пчелиње друштво припремљено за наредну пашу



Слика 2.39. Развој ћелињег друштва: Јосле багремове паше (под а.); за сунцокрећову пашу (под б.); превешавањем легла (под в.)

2.7.2. Други начин - разројавање јачелињих друштава применом Пелешовог системе


Ако се планира следећа паша, на пример сунцокретова, са знатно јачим пчелињим друштвом, него што то може да буде друштво са једном матицом, као на слици 2.39., одмах после багремове паше (после врдања меда), могуће је учинити следеће:

- у наставку на подњачи остави се матица са 1-2 рама са отвореним леглом, 2 рама са ситном основом (до легла), 4 рама са извученим саћем и 2-3 рама са медом и полсном;
- на тај наставак, преко матичне решетке постави се медиште (са размовима са извршеним медом), затим се постави подна даска (са замреженим отворм на поду и са посебним листом);
- на подну даску постави се трсћи наставак са преосталим, комплесним, леглом (слика 2.40.), у који се дода или млада матица у кавезу, или затворсни, зрели, матичнак.

Шта се овим поступком разројавања постиже?



Слика 2.40. Двојно друштво после багремове паше



Слика 2.41. Свођење двојног друштва (под а.) на једноматично друштво (под б.) и нуклеус


У доњем наставку матица има доволно простора за полагање јаја. У горњем, трсћем наставку, где је преостало легло са младим пчелама, развија се ново друштво. Понишћи ће све сабирачице из трсћег наставка прећи у доње друштво, ту је и медиште за унос нектара, ако га буде било.

Овим поступком разројавања основно друштво се не слаби: све су сабирачице у кошици и све легло је у кошици, под истим кровом.

Ускоро, кад стигне следећа паша, ово двоматично (двојно) друштво биће изузетно снажно пчелиње друштво које се може преуредити за пашу тако да му се склони стара матица (у нуклеус), и да се у пашу иде са младом матицом (слика 2.41.). Може се ићи у наредну пашу двојно, а може се друштво преуредити и за двоматично пчеларење, итд.

Према томе, ако се после багремове паше вишак младих пчела (око 20 хиљада) искористи за формирање новог друштва, и ако се оба друштва под истим кровом правилно развијају, у сунцокретову пашу ће ући такво друштво са 60-65 хиљада пчела (слика 2.42.) и, наравно, такво друштво да ће знатно више меса, него пчелиње друштво код којег је превешавано легло после багремове паше (слика 2.39.).

Предност првог или другог начина развоја друштва после багремове паше може се сагледати и на основу приказа датог у таблици 2.2.



Слика 2.42. Формирање новог друштва после багремове паше: а. друштво пре разрођавања; б. разрођено друштво; в. друштво непосредно пре сунцокретовој пашу; г. друштво у сунцокретовој пашу (једна од могућих варијација); д. нуклеус са старом матицом

Таблица 2.1. Развој друштва после багремове паше

| Основне карактеристике друштва | први начин | други начин |
|---|------------|-------------|
| Укупан број пчела | 50.000 | 65.000 |
| Укупно (отворено) легло (dm^2) | 40 | 40 |
| Укупно неговатељица | 20.000 | 20.000 |
| Укупно сабирачица | 30.000 | 45.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 3 | 4,5 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 |
| Мед за врџање (kg) | 2 | 3,5 |

Да ли ће се применити први или други начин развоја пчелињег друштва после багремове паше, највише зависи од самог пчелара:

- Ако пчелар сам узгаја матице пресађивањем ларви и ако их има довољно одмах после багремове паше, нормално је да ће се пчелар одлучити за други начин развоја друштва, формирањем двојног друштва, тим пре што туј начин омогућује да истовремено потпуно елиминише појаву ројевог нагона, и да уведе у друштво нову младу матицу;

- Ако пчелар није савладао технику узгоја матица, принуђен је да применију први начин развоја друштва, уз стално превешавање легла из пло-дишта у медиште и уз сталну бригу да не дође до појаве ројевог нагона.


2.8. Припрема ичеливых друштава за сунцокретову пашу

Ако је следећа папија сунцокретова и ако се пчелиње друштво развило како треба, његов изглед (око 25. јуна) треба да буде као што је приказано на слици 2.43.


Тако развијено друштво може се крајем јуна селити на сунцокретову пашу у два дела: посебно горње друштво, и посебно доње друштво. На локацији сунцокретове паше опет се формира двојно друштво, са 2-3 медишта, и усмре пчеле из горњег друштва у доње кад сунцокрет замеди (слика 2.44.).

За сунцокретову пашу трсба очекивати да се горње друштво развило са најмање око 20 хиљада пчела, а доње са око 50 хиљада пчела.

Пчелиње друштво приказано на слици 2.43. може се пресудити у двоматично друштво замсном подне даске (ПД) матичном рецистру (MP) и срећивањем друштва као на слици 2.45.




Слика 2.43. Изглед йчелињег друштва испред сунцокрећову Јашу (око 25. јуна)



Слика 2.44. Двојно
їчеларење у
сунцокретовој јасни



*Слика 2.45. Двомашично
йчеларење у
сунчокрејповој йаши*



Слика 2.46. Свођење
двојног друштва на
једномајично

Може се пчелињем друштву на слици 2.43. одузети једна матица са 2-3 рама легла и формирати јако друштво са једном матицом (слика 2.46. под а.) и нуклеус (слика 2.46. под б.).

ЈУЛ

Месец јул је карактеристичан, нарочито по томе, што је у том месецу по правилу безпашији период у многим крајевима, што су температуре у просеку врло високе и што у овом периоду треба започети са одређеним припремама за предстојећу зиму. Међутим, у пределима где се негује сунцокрет, у том месецу је главна сунцокретова паши.

Два су специфична послана која треба обавити у овом месецу:

- сеоба на сунцокретову пашу и
- припреме да у сваком производном друштву у току августа две матице "производе" легло, тј. да два друштва под истим кровом сакупљају мед и полен, а да се крајем августа друштво зазими са једном и то бољом матицом.

2.8.1. Сеоба на сунцокретову пашу

Почетком јула почиње једна од познатих главних паши - сунцокретова паши. Сеобом пчелињих друштава на сунцокретову пашу, постижу се два циља:


- први, да се остваре приноси меда. Под нормалним условима пчеларења, са развијеним друштвима, може да се изврда најмање 20-30 kg меда по друштву;
- други, да пчелиња друштва сакупе мед за себе за зиму и да се избегне прихрањивање пчелињих друштава шећерним сирупом. Сеоба на сунцокретову пашу препоручује се нарочито пчеларима у крајевима где се поред багремове паши не очекују друге паши.

2.8.2. Припреме за зазимљавање у јулу


Крајем јула, после сунцокретове паши, могуће су бројне варијантите пчеларења:

- ако је пчелиње друштво једиоматично, може се, после врцања меда, формирати друштво као на слици 2.47. под а., и даље поступати са њим иначин како је то објашњено у одељку 2.2.,
- ако је пчелиње друштво по завршетку сунцокретове паши изузетно јако, (6-7 рамова са леглом, преко 20 рамова са пчелама) и ако пчелар има резервне матице, може се формирати ново друштво, као на слици 2.47. под б., које се пусти да се двојно (или двоматично) развија целог августа

(најкасније до 15. септембра). Тада се такво двојно друштво споји у једноматично, при чему ће пчеле саме одабрати бољу матицу. Овакав начин припреме за зазимљавање пчелињег друштва, када се од два друштва спајањем добија једно јако друштво, је један од најбољих начина зазимљавања пчелињих друштава. Такво друштво има доста младих пчела, полена и хране,



Слика 2.47. Припреме за зазимљавање
крајем јуна



Слика 2.48. Коришћење нуклеуса за
појачавање основног друштва за зиму

- ако пчелар има доста нуклеуса, још је боље да се нуклеус са младом матицом споји (преко листа новина и матичне решетке) са основним друштвом са старом матицом (слика 2.48. под а.) и пусти да се спојено друштво у току августа развија двоматично (или двојно) (слика 2.48. под б.). Крајем августа склони се матична решетка (или подна даска) и формира се једноматично друштво, са матицом коју саме пчеле изаберу.

СРПСКО
ПЧЕЛАРСКО ДРУШТВО

Бр. 375.

15 августа 1933
Београд

УВЕРЕЊЕ

Г. Ђорђа Ј. Атанасијовићу
из Кралевца (Кралевача Јањ). посетио је десето-
дневни пчеларски течај за учитеље, који је
одржан на пчелињаку Српскога пчеларскога дру-
штва у Београду од 5 до 15 августа 1933 г.

Предавања је посебно уредио и пратио мар-
љиво и показао је доволно схваташте и разумевање
из области свих предмета пчеларства о којима је
предавано на течају.



Управник течаја,
Потпредседник
Срп пчеларског друштва

Др. Ђ. Јовановић

НЕКАДА СЕ И ОВАКО РАДИЛО

3. ТЕ ДВ ГЛ

У прак
приносе ме
да, нарочит
Многи због
знатан број

У вези с
- никад
- спајат
има ћи
- вишег
слабои
- пчелај
ње јед
чавањ
прино
- пчелар
на пче
оствар
пчелин
лико и

Да се сп
зултати у пр
чино, у наред:

Пример

Ако су с
развила так-
друштво (Б)
учествују у 1
(А) донеће м
ни за себе (т)

Међутим
тако спојено
врдање (таб)

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА СПАЈАЊЕМ ДВА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА У ЈЕДНО ПРЕД ГЛАВНУ ПАШУ

У пракси је познато да само јака пчелиња друштва доносе високе принос меда. Због тога искусни пчелари на различите начине чине напоре да, нарочито за багремову (рану главну) пашу, обезбеде што јача друштва. Многи због тога пчеларе двојно, двоматично, или користе налет пчела, а знатан број пчелара практикује спајање пчелињих друштава.

У вези са спајањем пчелињих друштава треба имати у виду следеће:

- никада не спајати два слаба друштва,
- спајати само слабо друштво са јачим друштвом, тј. са друштвом које има преко 20 хиљада пчела,
- виште ће дати меда пчелиње друштво настало спајањем средње јаког и слабог друштва, него виште слабих друштава,
- пчелар који гаји нуклеусе (помоћна друштва), и то по правилу најмање један нуклеус на два производна друштва, и исте користи за појачавање производних друштава спајањем, увек ће остварити високе принос меда,
- пчелар који је увидео да су слаба друштва безкорисна, чак и штетна на пчелињаку, а да средње јако друштво ојачано слабим друштвом, остварује знатно веће приносе, чак и кад нема слабих друштава на пчелињаку, сам преформира једно јако друштво, да би појачао неколико производних друштава.

Да се спајањем пчелињих друштава заиста остварују знатно бољи резултати у приносу меда, него кад се пчелари са сваким друштвом појединачно, у наредних неколико примера биће објапњено.

Пример 1.

Ако су се непосредно пред главну пашу два пчелиња друштва (А и Б) развила тако да једно друштво (А) има око 30 хиљада пчела, а друго друштво (Б) око 15 хиљада пчела, и ако та два друштва, тако развијена, учествују у главној паши, резултат приноса меда биће следећи: друштво (А) донеће меда само за себе, а друштво (Б) неће донети довољно меда чак ни за себе (таблица 3.1. колона 2 и 3).

Међутим, ако се друштво (А) и друштво (Б) споје у једно друштво, и тако спојено учествује у главној паши, донеће довољно меда и за себе, и за врџање (таблица 3.1. колона 4).

Таблица 3.1. Резултатни приноси меда посебно друштва (А) и друштва (Б) и кад су та друштва спојена у једно

| Основне карактеристике друштва | А | Б | А + Б |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупан број пчела | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 10.000 | - | 25.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 1 | - | 2,5 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врцање (kg) | 0 | -1 | 1,5 |

Пример 2

Ако непосредно пред багремову пашу ичилића друштва (А и Б) садрже приближно по 30 хиљада пчела, у багремовој паши су два друштва једва ће сакупити онолико меда колико њима треба, а за врцање неће бити меда (таблица 3.2. колона 2 и 3). Међутим, ако се ту два друштва споје у једно, сакупићеовољно меда и за себе и за врцање (таблица 3.2. колона 4).

Таблица 3.2. Резултатни приноси меда два средње развијена друштва и добијеног њиховим спојањем

| Основне карактеристике друштва | А | Б | А + Б |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупан број пчела | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 1 | 1 | 4 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врцање (kg) | 0 | 0 | 3 |

Пример 3

Ако су се непосредно пред багремову пашу два друштва (А и Б) развила тако да једно (А) има око 40 хиљада пчела, а друго (Б) да има око 15 хиљада пчела, спајањем та два друштва у једно друштво, добија се јако друштво које ће донети знатно више меда, него да су ту два друштва појединачно учествовала у месодобранују (таблица 3.3. колона 2, 3 и 4).

Таблица 3.

| |
|-------------------------------------|
| Основне карактеристике друштва |
| Укупан број пчела |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) |
| Укупан број неговатиљица легла |
| Укупно сакупљено меда (kg) |
| Укупна потрошња меда (kg) |
| Мед за врцање |

Пример 4

Ако су се непосредно пред багремову пашу два средње развијена друштва (А и Б) развила тако да једно (А) има око 40 хиљада пчела, а друго (Б) да има око 15 хиљада пчела, спајањем та два друштва у једно друштво, добија се јако друштво које ће донети знатно више меда, него да су ту два друштва појединачно учествовала у месодобранују (таблица 3.3. колона 2, 3 и 4).

Таблица 3.4.

| |
|-------------------------------------|
| Основне карактеристике друштва |
| Укупан број пчела |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) |
| Укупан број неговатиљица легла |
| Укупно сакупљено меда (kg) |
| Укупна потрошња меда (kg) |
| Мед за врцање |

Пример 5

На крају месодобранују, ако највећи принос меда имају друштва која имају високу принос меда, ако најмањи принос меда имају друштва која имају низаку принос меда.

Ако највећи принос меда имају друштва која имају високу принос меда, ако најмањи принос меда имају друштва која имају низаку принос меда.

Таблица 3.3. Резултати приноса меда спајањем средње развијеног и слабог друштава

| Основне карактеристике друштва | A | B | A + B |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупан број пчела | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 20.000 | - | 35.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 2 | - | 3,5 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | -1 | 1 |
| Мед за врчање (kg) | 1 | -1 | 2,5 |

Пример 4

Ако су се пред багремову пашу три друштва развила тако да два друштва (A и B) имају појединачно по око 40 хиљада пчела, а друштво (B) око 15 хиљада пчела, у главној пashi сва три друштва донеће укупно знатно мање меда ако самостално учествују у медобрану (таблица 3.4. колона 2, 3 и 4), исто ако се друштво (A) и друштво (B) појачају спајањем са делом слабијег друштва (B) (таблица 3.4. колона 5 и 6).

Таблица 3.4. Резултати приноса меда два средње развијена друштава спојена са делом једног слабијег друштава

| Основне карактеристике друштва | A | B | B | A+1/2B | B+1/2B |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Укупан број пчела | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 47.500 | 47.500 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 20.000 | 20.000 | - | 27.500 | 27.500 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 2 | 2 | - | 2,75 | 2,75 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врчање (kg) | 1 | 1 | -1 | 1,75 | 1,75 |

Пример 5

На крају, нека је пет пчелињих друштава (A, B, В, Г и Д) пред багремову пашу развијено тако да свако садржи око 50 хиљада пчела. То су, очигледно, доста јака друштва, али не толико јака да могу да остваре високе приносе меда. Високе приносе меда могу да остваре само пчелиња друштва која садрже 60-65 хиљада пчела.

Ако наведена друштва самостално учествују у главној пashi, резултати приноса меда приказани су у таблици 3.5.

Таблица 3.5. Резултати приноса меда ћети средње развијених друштава

| Основне карактеристике друштва | А | Б | В | Г | Д |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Укупан број пчела | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врцање (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Укупно меда за врцање: 10 kg.

Ако се непосредно пред багремову пашу једно од наведених друштава расформира, нпр. друштво (Д) и са њим појачају прсостала четири друштва, укупни резултати медобрања су за око 40% већи (таблица 3.6.).

Таблица 3.6. Резултати приноса меда четири средње развијена друштава ојачана непосредно пред њену делом ћетиго друштава

| Основне карактеристике друштва | А+1/4Д | Б+1/4Д | В+1/4Д | Г+1/4Д |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Укупан број пчела | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Укупно (отвореног) легла (dm^2) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врцање (kg) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |

Укупно меда за врцање : 13 kg.

Наведени примери ма колико да су илустративног карактера, потпуно се у пракси потврђују и сасвим јасно указују:

- да без јаких пчелињих друштава нема високих приноса меда,
- да су слаба друштва неспособна да донесу доволно меда ни за себе.

Посту

Посту
дана пред
на следећ

- из с
леглом, м
- са п
и сл. и ди
на) мрежа
3,2),

- кроз
вентилација
подњачи 1
3-4 рама
преко мат
друштва (




Слика 3.1
друштво с

Код сп
користи и
се два пр
вентилација
ексера. Да
спојиле, м


Поступак спајања пчелињих друштава

Поступак спајања пчелињих друштава је врло једноставан. На око 15 дана пред главну пашу два пчелиња друштва (А и Б, слика 3.1.) спајају се на следећи начин:

- из слабијег друштва (нпр. Б) пронађе се матица и са 2-3 рама са леглом, медом, поленом и пчелама стави у нуклеус,
- са пчелињег друштва (А) склони се кров, хранилица, поклопна даска и сл. и директно прско наставка са пчелама стави се вентилациона (жичана) мрежа, без лета (ВМ), а на њу се стави друштво (Б) без матице (слика 3.2),
- кроз 1-2 дана, када се изједначе мириси у оба друштва, склони се вентилациону мрежу и спојено друштво се среди тако да се у наставку на подњачи нађе матица, са 1-2 рама отвореног легла, 2-3 рама сатне основе, 3-4 рама са извученим саћем и 2-3 рама са медом и поленом. Затим се преко матичне решетке поставе наставци са осталим леглом из оба спојена друштва (слика 3.3).



Слика 3.1. Два пчелиња друштва (A и B) пре спајања



Слика 3.2. Спајање друштва (A) и друштва (B)



Слика 3.3. Сређивање спојеног друштва

Код спајања два пчелиња друштва често се уместо вентилационе мреже користи подна даска са замрежним дном и затвореним летима. Најчешће се два пчелиња друштва спајају преко листа новина, тако што се уместо вентилационе мреже или подне даске стави лист новина избушен врхом ексерса. Док пчеле из доњег и горњег друштва избуште лист новина да би се спојиле, мириси ће им се изједначити.



НА МАЊИМ ПЧЕЛИЊАЦИМА
 (пчелињак С.Поповића, Ш.Богдановића, С.Јовановића и В.Анића - околина Бајејева)
 снимки: С.П.

4. ТЕ КС ГЛ

4.1. У

Да би и постриж и
 Тако снажни
 прељ багрети
 гона, нарочи
 сиурни и и
 тва пчелама
 Тада када ће
 за појављива
 тог другите

| |
|---------------|
| <u>Основи</u> |
| Укушан |
| Укуничко |
| Укулан |
| Укунто |
| Укунича |
| Мелза |

4. ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА КОРИШЋЕЊЕМ НАЛЕТА ПЧЕЛА У ГЛАВНОЈ ПАШИ

4.1. Уводне напомене

Да би производно пчелиње друштво остварило високос принос меда, потребно је да у главној паши буде јако друштво са 60-65 хиљада пчела. Тако снажно пчелиње друштво, на пример, за рану багремову пашу тешко се формира са једном матицом. Због тога се на око 15 дана пред багремову пащу производним друштвима, која немају најмање 10 рамова легла, додаје затворено легло из помоћних друштава, јер ће се из тих 10 рамова легла издећи 60-65 хиљада пчела сабирачица у главној паши. Сличан резултат се постиже и спајањем два друштва, о чemu је већ било речи.

Међутим, појачавање производних друштава леглом, на око 15 дана пред багремову пащу, носи са собом велику опасност од појаве ројевог напона, нарочито ако из било којих разлога изостане главна паши. Зато је сигуријни и ефикаснији систем пчеларења појачавањем производног друштва пчелама сабирачицама из другог друштва, налетом пчела, и то баш тада када пчелар процени да је најбоље да се то учини. Ишак, право време за појачавање производног друштва сабирачицама, налетом пчела из другог друштва, јесте тренутак кад замоди главна паши.

Таблица 4.1. Однос припоса меда без и са налетеом пчела.

| Основне карактеристике друштва | A | Б | А + Б |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупан број пчела | 40.000 | 40.000 | 55.000 |
| Укупно (затвореног) легла (dm^3) | 40 | 40 | 40 |
| Укупан број неговатиљица легла | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Укупан број сабирачица | 20.000 | 20.000 | 35.000 |
| Укупно сакупљено меда (kg) | 2 | 2 | 3,5 |
| Укупна потрошња меда (kg) | 1 | 1 | 1 |
| Мед за врчавање (kg) | 1 | 1 | 2,5 |

Ако су се два пчелиња друштва, која се налазе једно поред другог, развила до почетка главне паше, тако да садрже свако по око 40 хиљада

пчела, и ако свако за себе учествује у главној паши, добиће се скоро 20-30% мање меда, него ако се једно друштво склони, да би све његове сабирачице ушли у друго производно друштво, налетом пчела (таблица 4.1. колона 4).

Наведени подаци у таблици 4.1. јасно показују да је поступак пчеларења налетом пчела ефикасан. Сем тога, овај поступак се препоручује и као поступак којим се избегава појава ројевог нагона.


4.2. Поступци пчеларења налетом пчела

Различити су поступци пчеларења налетом пчела, али се сви ти поступци могу сврстати у следеће групе:

- Пчеларење са два пчелиња друштва током целе године и коришћење налета пчела једног друштва за појачавање другог друштва у главној паши;
- Појачавање производних друштава налистом пчела са другог пчелињака у главној паши;
- Пчеларење налетом пчела код пчелињих друштава размештених у групама (или у низу) са три и више друштава.

4.2.1. Пчеларење са два јачелиња друштава током целе године и коришћење налетећа јачела једног друштава за појачавање другог друштава у главној паши

У складу са технологијом зазимљавања (одељак 2.2.), зазиме се сва пчелиња друштва у групама од по два пчелиња друштва (слика 4.1.). Веома јебитно да су оба друштва у групи једнаке, или сличне јачине.



Слика 4.1. Размештај јачелињих друштава на јачелињаку у групама од по два друштава: лево - производно друштво, десно - помоћно друштво

У фази зазимљавања оба друштва у групи су зазимљена тако да свако има по 20-25 хиљада пчела, са доста квалитетне хране, добром мсдном капом и др.

Са свима зазимљавања са једним

Приметнији су



Слика


Среди селекције паши, и веома великији један рам

На свим селекцијама



Са сваким пчелињим друштвом у групи посебно се поступа у свим фазама зазимљавања и пролећног развоја у складу са технологијом пчеларења са једном матицом (одељак 2.2 и 2.3).


Пример могућег стања на пчелињаку почетком априла приказан је на слици 4.2.



Слика 4.2. Стапање на пчелињаку почетком априла: 10 пчелињих друштава (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11) су у групама од по два друштва, а 4 помоћна друштва (7, 12, 13 и 14) су ван група


Средином воћне паше, кад цвета јабука, веома је битно да се изврши селекција пчелињих друштава на она која могу да учествују у главној папи, и на она друштва која то не могу. Критеријум за наведену селекцију је величина легла у пчелињем друштву: пчелиња друштва са три и мање од три рама легла су слаба и она се никаквим појачавањем не могу припремити за главну пашу; пчелиња друштва са четири и више од четири рама легла могу се развити за главну пашу, нарочито ако им се дода по један рам са леглом из помоћних друштава.

На слици 4.3. приказана је јачина пчелињих друштава на пчелињаку пре селекције, а на слици 4.4. јачина пчелињих друштава после селекције.




Слика 4.3. Јачина пчелињих друштава пре селекције

Селекцијом пчелињих друштава постиже се да се оба пчелиња друштва у групи, производно и помоћно, што боље развију до главне паше. На потпуно исти начин као код пчеларсња са једном матицом, обављају се потребне фазе пчеларења са сваким друштвом посебно.



Слика 4.4. Јачина пчелиних друштава јасле селекције

Тако, на пример, половином априла (средином периода цветања јабуке), кад у плодишту и основног (A) и помоћног друштва (B) има по 9-10 рамова са пчелама и 6-7 рамова са леглом, врши се проширивање простора у кошници у оба друштва додавањем наставка изнад плодишта, ако је плодиште у једном наставку и ако је топло време, или додавањем наставка испод плодишта, ако је време хладно (слика 4.5).



Слика 4.5. Проширивање простора у кошници додавањем наставака

Ако је пчелиње друштво у два наставка, врши се замсна места наставака као што је приказано на слици 4.6.

Слик
2
1

Око 20.
што је прик




Слика 4.7.
помоћног друштва

Горњи
доњи наст
личним сај
наставака ћ
додатно ра:

Матица
живе јаја у
настају при
јако друшт
лом, и то о

У оквиј
пчелиња д
пашу тако ;




Слика 4.6. Проширивање простора у кошници заменом месића наставака

Око 20. априла, крајем периода воћне паше, стање у оба друштва је као што је приказано на слици 4.7.



Слика 4.7. Стапање производног (А) и помоћног друштва (Б) крајем периода воћне паше



Слика 4.8. Замена месића наставака код друштва (А) и друштва (Б) крајем воћне паше


Горњи наставак је пун пчелама и претежно отвореним леглом, а у доњем наставку се налази претежно затворено легло и по који рам са радиличним саћем из којег су се излагле пчеле. Тада се извршила замена места наставака и заокретање плодишта за 180° , да би се оба пчелиња друштва додатно развила (слика 4.8.).

Матица ће убрзо прески у горњи наставак и у наредних 5-7 дана положиће јаја у празно саће у горњем наставку. Практично, око 25. априла, кад настају припреме за багремову пашу (на око 15 дана пред багремову пашу), јако друштво, са добром матицом, испуниће оба наставка пчелама и леглом, и то око 20 рамова са пчелама и 10-14 рамова са леглом (слика 4.9.).


У оквиру припреме за багремову пашу, око 25. априла, потребно је оба пчелиња друштва (и производно, и помоћно) припремити за багремову пашу тако да се у њима задржи јачина друштва, да матица и даље интензи-

вно полаже јаја, и да се истовремено елиминише могућност појаве ројевог нагона. То се може постићи или превешавањем легла, или додавањем трећег наставка између два плодишна наставка, о чему је детаљно било речи у одељку 2.5.1. и 2.5.2.

До багремове паше, ако је безспашни период, пчелиња друштва треба прихранити.




Слика 4.9. Стапање производног и помоћног друштва у две куће (А и Б) пре приступа багрему



Слика 4.10. Стапање производног (А) и помоћног друштва (Б) непосредно пре приступа багрему

Непосредно пред багремову пашу стање у оба друштва је као на слици 4.10.

Кад багрем замеди, око 10 маја, на основном друштву (А) широм отворити лето на подњачи као и помоћна лета на медиштима и додати још једно медиште. Истовремено се помоћно друштво (Б) помери лево од производног друштва, као што је приказано на слици 4.11. На тај начин све сабирачице из помоћног друштва се уђу у производно друштво (А), налетом пчела, и тако знатно ојачати сакупљачку снагу производног друштва у главној паси.



Слика 4.11. Стапање производног и помоћног друштва у багремовој паси

У з...
изводног
УКС
(А) и п...
багрем...
тва пр...
а на до...
таве се...
вентил...
или пр...
замреж...
4.12.).

Кад...
горње...
произв...
вентил...
ска, и н...
стави п...
са отв...
медиши

При...
постави

Слика

пчелињ...
Стат...
тате ак...
и исте, 1...
не знач...
произв...

У зависности од интензитета багремове паше, водити рачуна да производно друштво има довољан број медишта.


Уколико се производно друштво (А) и помоћно друштво (Б) селе на багремову пашу, тада се оба друштва припреме за ссобу појединачно, а на досељеном месту на папи, поставе се једно изнад другог, преко вентилационе мреже (ВМ) са летом, или преко подне даске (ПД) са замреженим дном и летом (слика 4.12.).

Кад багрем замеди, склони се горње друштво, лево или десно од производног друштва, склони се вентилационе мреже, или подна даска, и на производно друштво се постави потребан број (1-2) медишта, са отвореним помоћним летима на медиштима (слика 4.13.).

При ссоби на багремову пашу производно и помоћно друштво мо-гу се поставити једно поред другог, као што је приказано на слици 4.10., а кад

багрем замеди, поступа се као што је приказано на слици 4.11.

Ако се укаже прилика да се пчелиња друштва после првог багрема селе на други багрем (или на неку другу временски близку пашу), у том случају може се поступити на следећи начин: замене се места производног (А) и помоћног друштва (Б) тако да помоћно друштво покупи сабирачице из производног друштва и на тај начин појачано сели на други багрем, а производно друштво без сабирачица, али са доста младих пчела и са медом, остаје на




Слика 4.12. Производно и помоћно друштво досељено на багремову пашу


Слика 4.13. Производно друштво (А) појачано сабирачицама из помоћног друштва (Б) налетеши јачела, кад багрем замеди

пчелињаку, све док мед не сазри за врчање (слика 4.14.).

Стално треба имати у виду да овај систем пчеларења даје добре резултате ако су оба пчелиња друштва (производно и помоћно) добро развијена и исте, или сличне, јачине. Дакле, назив "помоћно друштво" у овом случају не значи и слабо друштво, већ јако друштво које у главној папи помаже производном друштву налетом пчела.




Слика 4.14. Припреме за други багрем




Слика 4.15. Стапање производног и помоћног друштава после багремове паше

После багремове паше, након врцања меда, и производио, и помоћно друштво су једно поред другог (слика 4.15.). Оба пчелиња друштва су јака, пуна пчела и лгља, и ако се тада брзо не предузму одговарајуће мере, доћи ће до појаве ројевог игаона.

Најбоље је поступити на начин како је то описано у одељку 2.7.2., односно оба друштва треба разројити као што је приказано на слици 4.16.



Слика 4.16. Разројавање производног и помоћног друштава после багремове паше



Слика 4.17. Пчелиње друштво из којег се одузимају сабирачице

Кад матица почне да полаже јаја у горњем наставку, у младом друштву, пчелар може да одлучи:

- или да настави пчеларење са производним и помоћним друштвом (двојис),
- или да уместо даске постави матичну решетку, па да настави да пчелари двоматично,
- или да споји оба друштва, при чemu ће пчеле задржати младу матицу, и да настави пчеларење са једном матицом.

4.2.2.

Да би у главио је да пче На једно штва чији ва налет пре и пос

Кад сабирачи вии пчел

Пост

- у п
4.17.) из и
- на

даска са или вент даску се настава иад наст она мре задњој с лс пчел тилацијо ње друш слици 4.

- све лињег д лето на ће у под

- пр ичеле са сабирач произво 4.19.). С даска, је поприм даске, и пашу (с отворит

4.2.2. Појачавање производног друштва у главној паши налетом пчела из друштва са другог пчелињака

Да би се применио метод пчеларсња појачавањем производног друштва у главној паши налетом пчела из друштва са другог пчелињака, потребно је да пчелар поседује два пчелињака која су удаљена један од другог 3-5 km. На једном пчелињаку су производна друштва, а на другом су пчелиња друштва чије ће се сабирачице користити за појачавање производних друштава налетом пчела у главној паши. Оба ова пчелиња друштва се развијају пре и после главне паше на начин како је то описано у поглављу 2.

Кад крене главна паша, тога дана у поподневним сатима одузму се сабирачице друштвима на другом пчелињаку и предвече се односе на основни пчелињак са производним друштвима.


Поступак одузимања сабирачица је следећи:

- у поподневним сатима склони се са подњаче пчелиње друштво (слика 4.17) из којег се одузимају сабирачице;


- на подњачу се ставља подна даска са замреженим дном и летом, или вентилациони мрежа. На подну даску се ставља наставак (или полунаставак) са извученим саћем, а изнад наставка се ставља вентилациони мрежа са отвореним летом на задњој страни, да би на њега излазиле пчеле из горњег друштва. На вентилациону мрежу се ставља пчелиње друштво као што је приказано на слици 4.18.;

- све пчеле сабирачице из пчелињег друштва изаћи ће на задње лето на вентилационој мрежи и ући ће у подметнути наставак (Н) на лето на подној дасци;

- предвече, кад све сабирачице уђу у подметнути наставак, и кад се пчеле смире, затвори се лето на подној дасци и склони се наставак (Н) са сабирачицама са подњачом и носи се на основни пчелињак на коме су производна друштва и ставља се одозго на производно друштво (слика 4.19.). Одмах се отвара лето на подној дасци. Сутрадан се склања подна даска, јер су сабирачице из наставка (Н), донете са другог пчелињака, попримиле мирис доњег производног друштва прско замрженог дна подне даске, и заједно са осталим сабирачицама из доњег друштва крећу у главну пашу (слика 4.20). На донесном наставку (Н) са сабирачицама обавезно отворити помоћно лето.




Слика 4.18. Поступак одузимања сабирачица из пчелињег друштва



Слика 4.19. Производно друштаво са донејшим настапаком (H) са сабирачицама



Слика 4.20. Производно друштво у главној паши са сабирачицама са другог челињака у настапаку (H)



Слика 4.21. Разројавање друштава после багремове паше

Производно друштво, које је иначе јако, ојачано на овај начин, биће још јаче у главној паши.


На другом помоћном челињаку челињаче друштво из кога су одузете сабирачице, враћа се на своје старо место на подњачу, али без сабирачица, односно, са својим младим пчелама. Задатак је пчелара да таквом друштву помогне да се оно даље развија и да "произведе" нове сабирачице за неку од наредних паша.

После багремове паше производно друштво, које је веома снажно, разројава се на начин како је то већ објашњено у одељку 2.7. (слика 4.21.).


Кад дође време за припрему за сунцокретову пашу, око 25. јуна, пчелар може да одлучи да ли ће да настави да пчелари двојно, двоматично, или једноматично итд. Наравно, ако пчелар има други помоћни челињак, кад сунцокрет замеди, свако производно друштво може да ојача сабирачицама са другог челињака на претходно описан начин.

4.2.3. Пчеларење налетејом ћела код ћелињих друштава размештених у групама или низу са ћери и више друштава

Код овог поступка пчеларења свако друштво у групи или низу развија се посебно, а кад почне главна паша, из групе или низа челињих друштава (слика 4.22.) склоне се у страну 1, 2 или више челињих друштава. Пчеле сабирачице из склоњених друштава појачаће налетом пчела челиња друштва која су остала у групи или низу (слика 4.23.).



Слика 4.22. Разменетај пчелињих друштава у групама или низу од ћо јцри и више друштава



Слика 4.23. Појачавање пчелињих друштава 1, 3, 5 и 7 углавно паси налетејом јчела из пчелињих друштава 2, 4 и 6

После багремове паше може се поступити на сличан начин како је то већ описано у одељку 4.2.1. и 4.2.2.



ПЧЕЛАРЕЊЕ СА ВИШЕ МАТИЦА
 (на пчелињаку инж. Зорана Ковачевића, Гроцка)
 снимио: С.П.

По
зазиме
Оба др
фази за


У ко
двомат
слици 5

Слика

У т
начин к
Поч
мснски
даска и
(ВМ) с
друштве


5. ДВОМАТИЧНО ПЧЕЛАРЕЊЕ ТОКОМ ЦЕЛОГ ПЕРИОДА ПАШЕ

Полазећи од технологије зазимљавања (одељак 2.2) у току августа зазиме се два друштва једно изнад другог преко подне даске (слика 5.1.). Оба друштва су подједнаке јачине, или је доње друштво нешто јаче. У фази зазимљавања поступа се са сваким друштвом посебно.



Слика 5.1. Зазимљавање два друштва (A и B) једно изнад другог

Уколико се у току зиме донесе одлука да се у наредној сезони пчелари двоматично, пчелиња друштва се могу зазимити како је то приказано на слици 5.2.




Слика 5.2. Припрема пчелињих друштава у току зиме за двоматично пчеларење

У току фебруара и марта поступа се са сваким друштвом посебно на начин како је то описано у одељку 2.3.



Почетком априла, или у првој половини априла, што зависи од временских услова, на око 4-6 недеља пред багремову пашу, склања се подна даска или подњача између два друштва и ставља се вентилациона мрежа (ВМ) са затвореним летом, да се у наредних 24 сата изједначи мирис у оба друштва (слика 5.3.). Затим се уместо вентилационе мреже ставља матична

ршешетка (слика 5.4.). Уместо вентилационе мреже може се ставити прекоматичне решетке лист новина избушен на неколико месета.



Слика 5.3.

Свајање два друштива помоћу вентилационе мреже


Слика 5.4.
Замена вентилационе мреже матичној решетком

Слика 5.5.

Сређивање двоматичног друштва

Спојена друштва се средс као на слици 5.5. Горња ласта, ако их је било, постепено се смањују, да би све пчеле користиле само доње лето.

У току пролећног развоја двоматичног друштва поред радова на пчелињаку у априлу (одељак 2.4.) потребно је сваких 7-10 дана мењати места плодиштима оба друштва уз истовремено заокретање плодишта за 180° , све до око 25. априла (слика 5.6.).




Слика 5.6. Замена места плодишти

По правилу, у доњем плодишту је легло, а мало меда, а у горњем плодишту је више меда, а мало листла. Заменом места плодишта постиже се бржи развој двоматичног друштва због тога што пчеле преносчи мед из доњег наставка у горњи, изнад легла, стварају услове да се пчеле боље хране, а матица да интензивније полаже яја.

Уколико нема уноса нектара после воћне паше, обавезно прихранити пчелиња друштва сирупом, или још боље погачом.

Ако је кишовито дуже од 5 дана, потребно је пчеле прихранити да би се запослиле пчелс на преради додате хране. Ако се то не уради,



Слика 5.7. Проширујање кошнице додавањем 1-2 медишића

може до

Кад (слика 5

Поче

10. маја,

ти пиро

рити по

Тада се

шта, али

се ис

шта да с

Зато се

са низре

друга (г

мед сазре

стављају

никако ј

Изна

да се ст

рочито а

њег пло

Пред

Слика

гла, меда

току авг

Крај

друштва

даска и д

Пред

нарочит

- две

- кој

дру

- кој

може доћи до губитка једне матице и до појаве ројевог нагона.

Кад се стекну услови за проширивање кошнице, додаје се 1-2 медишита (слика 5.7).

Почетком багремове паше, око 10. маја, кад багрем забели, отворити широм лета на подњачки и отворити помоћна лета на медиштима. Тада се додаје потребан број медишта, али се при томе води рачуна да се не ставља превелики број медишта да се кошница ис би преврнула. Зато се повремено скидају медишита са незрелим медом и стављају на друга (помоћна) друштва како би мед сазрео. Медишта се искључиво стављају преко горњег плодишта, а никако испод плодишта (слика 5.8.).

Изнад горњег плодишта не мора да се ставља матична решетка, нарочито ако се у медишту изнад горњег плодишта разреди број рамова (уместо 10 рамова стави се 9).

Пред сваку наредну пашу треба вршити замену места плодишта.




Слика 5.9. Двоматично друштво почетком августа

Крајем јула, почетком августа, доње друштво обично има 8-9 рамова са леглом, а једва 1-2 рама са медом и поленом, а горње друштво има мало легла, а доста меда. Због тога се оба друштва среде тако што се из доњег плодишта пребаци легло у горње плодиште, а из горњег плодишта се пребаци мед и полен у доње плодиште. Прерасподелом лесла, меда и полена на овај начин оба друштва су уједначе (слика 5.9.). У току августа обаве се сви радови предвиђени за тај месец (одељак 2.2.).

Крајем августа, ако су матице у оба друштва квалитетне и ако су оба друштва припремљена за зиму, уместо матичне решетке ставља се подна даска и друштва се зазиме како је то приказано на слици 5.1.

Предности двоматичних друштава над једноматичним друштвима су нарочито у следећем:

- двоматична друштва дају доста меда, полена и прополиса,
- код двоматичних друштава ројење пчела је много ређе, него код друштава са једном матицом,
- код двоматичних друштава ретко се јавља кречно легло, ноземоза и



Слика 5.8. Двоматично друштво у главној паши

друге болести, јер су друштва јака,

- двоматична друштва, кад мењају матицу, то чине тихом заменом,
- на пчелињаку са двоматичним друштвима нема грабежи,
- код двоматичног пчеларења треба мање подњача, кровова, хранилица.

Тешкоће у раду са двоматичним друштвима су:

- постолја за двоматична друштва морају да буду чврста и јака,
- сви послови у вези са двоматичним пчеларењем морају да се обављају строго на време,
- код сеобе двоматичних друштава мора да се обезбеди добра вентилација, што се остварује употребом вентилационе мреже изнад горњег наставка.

6.

У 1
пчелар
двомат


Пч
под а.)
(лопи
подња
легла,
по пра
све ос
(пречн

На
5.2., а у
Тада с
споје 1
избуц
дана дј
По
друга 1

6. ПОЛУДВОМАТИЧНО ПЧЕЛАРЕЊЕ

У нашој земљи веома мали број пчелара користи двоматични систем пчеларења током целе пашњачне сезоне, али зато доста пчелара користи полу-двоматично пчеларење које се састоји у следећем:

Пчелари се двоматично до на око 15 дана до главног паше (слика 6.1. под а.), на претходно описан начин (поглавље 5.), а тада се уклони једна (лошија) матица у нуклеус (са 2-3 рама легла). Друштво се среди тако да на подњачи буде матица са 1-2 рама отворног легла, са 2 сатне основе до легла, са 4 рама извученог саба и 2 рама меда и полена. Изнад плодишта је по правилу матична решетка, а затим су медишта у којима је размештено све остало легло (слика 6.1. под б.). На сваком медишту је округли отвор (пречника 25-30 mm) који служи као помоћно лето.



Слика 6.1. Свођење двоматичног друштва на једноматично

Највећи број пчелара зазими пчелиња друштва као на слици 5.1. или 5.2., а у току пролећа развија свако друштво посебно, све до око 25. априла. Тада се склони лошија матица у нуклеус (са 2-3 рама легла), а друштва се споје тако што се уместо подне даске стави или вентилациони мрежа, или избушени лист новина и матична решетка (MP), да би се кроз један до два дана друштво средило на исти начин као на слици 6.1. под б.

После врчања багремовог меда, у основно пчелиње друштво уводи се друга матица, на начин како је то објашњено у одељку 2.7.2.



**ГУМЕНИ ҚАИШЕВИ СА МЕТАЛНИМ СТЕГАМА
ЗА БРЗО, ЛАКО И СИГУРНО СЕЉЕЊЕ ПЧЕЛА НА ПАШУ**



**ХВАТАЧИ ПОЛЕНА (ЛИМЕНИ)
СТАВЉАЈУ СЕ НА ЛЕТА СВАКЕ КОШНИЦЕ
СКИДАЊЕ ПОЛЕНА НОН-СТОП!**

Анти Иван, 011/473-882
Александар Војиновић, 011/130-025

Ко
прика
тима и
замреж
посебн

Ук
друштв
5.2.


Пр
друштв
начин

Ар
льсна и
7.1. по
јима и
ведено
плоди

По
войнице
већ и
полен
места

7. ПЧЕЛАРЕЊЕ ДВОЈНИМ ДРУШТВИМА

Код пчеларења двојним друштвима зазиме се два друштва као што је приказано на слици 7.1., преко специјалне подне даске (СД), са дуплим лептима на предњој и задњој страни даске, или на све четири стране даске, и са замреженим отвором на поду^{*)}. Зазимљавање се врши са сваким друштвом посебно, у складу са технологијом зазимљавања (одељак 2.3.).




Уколико се у току зиме донесе одлука да се пчелари двојно, пчелиња друштва се пажљиво, у току зиме, формирају као што је показано на слици 5.2.

Пред пролећни развој пчелињих друштава врши се на већ описан начин (одељак 2.4.).

Ако су пчелиња друштва зазимљена као што је приказано на слици 7.1. под III, са полунаставцима у којима има меда, половином марта на ведене полунаставке ставити испод плодишта (слика 7.2.).


Почетком априла, тј. почетком воћне паше, кад пчелиња друштва већ имају легла на 3-4 рама и меда и полена на 2-3 рама, замене им се места плодишта, ради форсирања развоја друштва (слика 7.3. под I и II).



Слика 7.2. Полунаставци са медом испод плодишта


^{*)} Детаљније видети: ЛИТЕРАТУРА - 24.

Код пчелињих друштава са полунаставцима испод плодишта, почетком воћне паše, полунаставци се дижу изнад плодишта, јер пчеле тада више доносе мед, него што га троше (слика 7.3. под III).



Слика 7.3. Замена места плодишта

Код друштава која су у току зиме постављена као на слици 5.2., почетком воћне паše, претходно се између њих постави специјална подна даска (СД), а затим, кроз један до два дана, замене им се места плодиштима.




Слика 7.4. Проширујање кошнице и замена места плодишта

Кад се друштва развију толико да имају 9-10 рамова са пчелама, врши се проширујање кошнице додавањем медишта, уз поновну замену места плодишта (слика 7.4.).

Ако је унос нектара у воћној паши обилан, додаје се још по једно медиште или полумедиште (слика 7.5.).

Медишта која се додају у воћној паши садрже, поред рамова са извученим саћем, и по 2-3 рама са сатним основама.

Код замене места плодишта, горњим друштвима додати мало сирупа.



Слика 7.5. Додајно проширување кошице у воћној паши


Кад багрем забели, двојним друштвима се додаје потребан број медишта (2-3), с тим што се претходно изврца мед из воћне паше, ако га је било. Истовремено се на специјалној подној дасци (СД) затвори предње горње лето, а отвори предње доње лето, да би се све сабирачице из горњег друштва усмериле у доње друштво (слика 7.6.). На подној дасци (СД) се отвори задње горње лето за младе пчеле које ће ускоро постати сабирачице у горњем друштву.

У главној паши се свим двојним друштвима отвори широм лето на подњачи, као и помоћна лета не медиштима.

Ако се процени да је на почетку главне паше доње друштво веома јако и да постоји опасност од појаве ројевог нагона, замсном места плодишта и усмеравањем пчела из горњег плодишта у доње, потпуно се елиминише појава ројевог нагона.

Уколико се процени да је потребно додати још једно медиште у главној паши, то се чини благовремено.

По завршетку багремове паше, одмах по врцању меда, замсне се места плодиштима и усмере се пчеле сабирачице из горњег друштва у доње друштво, манипулацијом двојних лета на подној дасци (СД), чиме се у потпуности елиминише појава ројевог нагона код доњег (а сада горњег) друштва (слика 7.7.).




Слика 7.6. Двојна друштвова у багремовој паши


Под манипулацијом двојним летима на специјалној подној дасци (СД), на којој су дупла леста постављена једно изнад другог, подразумева се следеће:

- затвара се горње лето на које излазе сабирачице горњег друштва, а отвара се доње лето, одмах испод горњег лета, чиме се све сабирачице из горњег друштва усмешавају у доње друштво,
- за будуће сабирачице горњег друштва отвара се горње лето на другој страни подне даске (СД).

Ако до наредне паше има доста времена, односно, ако се иде тек на сунцокретову пашу, може се из друштва које је у багремовој папи било доње друштво и које је по завршетку багремове паше достигло максимални развој, формирати један рој, као што је то приказано на слици 7.8.



Слика 7.7. Двојна друштвина ћој завршетку главне паше



Слика 7.8. Формирање роја (ПЛЗ) из доњег друштва ћој завршетку главне паше

Наведени рој ће се знатно развити до сунцокретове паше. У сунцокретовој паши склони се једно од три друштва, са слабијом матицом, чиме ће се двојно друштво додатно ојачати за сунцокретову пашу.

Уколико се после багремове паше иде на иску од временски близких паша (багремац, липа и др.), замсном места плодишта избегнути је могућност појаве ројевог нагона (слика 7.7.), а двојно друштво има све услове да оствари високе приносе меда.

Битно је да се у наредним пашама води рачуна да у доњем друштву не дође до појаве ројевог нагона. Међутим, кад год се процени да је једно од два друштва веомајако и да може да дође до појаве ројевог нагона, замсном месту плодишта, и усмешавањем пчела из горњег друштва у доње, елиминише се ројеви нагон.

По завршетку последње паше, крајем јула - почтком августа, двојна друштва се своде на стање припреме за зазимљавање (слика 7.1.).

Основне карактеристике пчеларења двојним друштвима су следеће:

- основно доње друштво и помоћно горње друштво су на једној подњачи, под истим кровом, са заједничким медиштем,
- горње друштво је нормално развијено друштво, нешто слабије од доњег основног друштва,
- оба друштва за главну пашу развијају се са укупно око 11-12 рамова легла (доње са око 6-7 рамова, а горње са 5-6 рамова),
- заменом места плодишта у воћној паши и пред главну пашу, и усмешавањем пчела на подној дасци са дуплиим летима, из горњег у доње друштво, потпуно се елиминише ројеви нагон,
- кад се има у виду да је опрема за двојно пчеларење нешто већа, него код једноматичног пчеларсна, али знатно мања него код пчеларења са два једноматична друштва, затим да се ројеви нагон потпуно елиминише, да за ово пчеларење треба временска колико и за једноматично (можда чак и мање), да је сађе у медиштима искључиво младо сађе, да се овим поступком ради искључиво са наставцима, а не са рамовима, да су приноси меда високи, итд., лако је закључити које су све предности двојног пчеларења*).

*¹⁾ Пчеларење двојним друштвима код нас се често назива Венеров систем пчеларења, јер га је први увео у праксу и знатно усавршио познати пчелар Иван Венер из Купинова. Детаљније видети часопис "Пчелар", 5/96 и 3/97.

СЗР ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАМОВА
ЗА КОШНИЦЕ

- РАДЕ - ЖАРКОВО

11132 ЖАРКОВО - БЕОГРАД

Пор. Спасића и Машере 57

Тел. 011/518-001

ПЧЕЛАРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ И АМАТЕРИ

ПЧЕЛАРСКА УДРУЖЕЊА

ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ КОЈЕ ПРОДАЈУ

ПЧЕЛАРСКИ ПРИБОР

Производимо све врсте рамова:

**a) СТАНДАРДНИ ХОФМАНОВИ РАМОВИ
ЗА КОШНИЦЕ**

- ЛР (Лангстротове) за плодиште и медишите
- ДБ (Дадан-Блатове) за плодиште и медишите
- АЖ (Гром и др.)
- Фаарове
- рамове по посебним поруџбинама

б) ВАНСТАНДАРДНИ ХОФМАНОВИ И АМАТЕРСКИ РАМОВИ

Рамове израђујемо од сувог јеловог дрвета, тополе, липе, врбе и др., без чвррова.
Наши рамови се не криве и сви су истих димензија, јер их израђујемо на специјалним машинама, специјалном технологијом.



**ПУДИМО ВАМ И КОШНИЦЕ ВЕОМА ПОВОЉНО
(ЛР, ДБ, ФАРАР) од сувог дрвета**



Нама је циљ да наше производе купите ради пробе, а после тога сигурни смо да ће те бити наш стални купац.

**СА НАШИМ РАМОВИМА И КОШНИЦАМА
- ПЧЕЛАРИЋЕТЕ СА ЗАДОВОЉСТВОМ!**

*Све појарбне информације можете добити сваког радног дана од 17-22 часа,
а суботом, недељом и празником од 8-22 часа, на телефон (011) 518-001*

РАДЕ - ЖАРКОВО


Са нама је могућ сваки коректан пословни договор.




8. КОМБИНОВАНО ПЧЕЛАРЕЊЕ: ДВОМАТИЧНО-ДВОЈНО-ЈЕДНОМАТИЧНО

У пракси се све чешће сусрећу различите комбинације двојног, двоматичног и једноматичног пчеларења.

Зазиме се два пчелиња друштва као на слици 7.1. У току раног пролећног развоја свако друштво се развија као да је само. У воћној паши, кад се плодишта развију са 9-10 рамова са пчелама, врши се замена места плодишних наставака, уз заокретање плодишта за 180° (слика 8.1.). Истога дана, уместо подне даске, поставља се вентилациони мрсжа, ради изједначавања мириза и спајања оба друштва преко матичне решетке. Уместо вентилационе мреже могу се поставити и новине пробушене на неколико места и матична решетка (слика 8.2.). Ако је на подној дасци замрежени отвор доста велик ($10-20 \text{ dm}^2$), тада се пчелиња друштва могу директно спајати стављањем матичне решетке, уместо уклонење подне даске.




Слика 8.1. Замена места
плодишних наставака




Слика 8.2. Спајање два друштва помоћу матичне решетке

Сваких наредних 7-10 дана врши се истовремено замена места плодишних наставака у оквиру истог друштва, затим замена места плодишта оба друштва и заокретање оба плодишта за 180° (слика 8.3.). То исто се

последњи пут учини на око 15 дана пред главну пашу. Истовремено се изврши и проширивање кошнице додавањем 1-2 медилгта, или полумедилшта, у зависности од степена развијености двоматичног друштва (слика 8.4.).




Слика 8.3. Дални развој двоматичног друштва




Слика 8.4. Замена места настапавака и ћрводилица и проширивање кошнице (око 25. априла)

Уколико до багремове паше нема уноса нектара, обавезио прихранити друштва.




Слика 8.5. Двоматична заједница сајремна за главну багремову пашу




Слика 8.6. Преуређивање двоматичног друштва у двојно друштво у главној паши

Око 10. маја, кад багрем забели, развијеност двоматично друштво може да се преуреди за двоматично пчеларење, као што је приказано на слици 8.5., или за двојно пчеларење, као што је приказано на слици 8.6. Може се друштво преуредити за једноматично пчеларење као што је приказано на слици 8.7. на тај начин што се на подњачу производног друштва ставља

плодиште са младом матицом, а поред њега лево, или десно, ставља се плодиште са старијом матицом.



Слика 8.7. Свођење двоматичног друштва на једноматично у главно паше



Слика 8.8. Припрема горњег друштва (ПЛ2) за други багрсм

Ако се двоматично пчелиње друштво сли, на пример, на други багрсм, може се доње друштво са старијом матицом (ПЛ1) и са месдиштима пуним меда (слика 8.6.), склонити лево или десно од старог места основног друштва, а на старо место се постави горње друштво (ПЛ2) са 1-2 месдишта, да покупи све сабирачице и да се тако ојачано сели на други багрсм (слика 8.8.). У доњем друштву (ПЛ1) остају младе пчеле које ће се старати да мед сазри и буде поклопљен и спреман за врцање.

После багрсмове паше у погледу разрођавања и даљег развоја друштва, поступа се на исти начин као код двојног, двоматичног или једноматичног пчеларења, у зависности од изабраног начина пчеларења.



власник:
ЛАСЛО КАРОЛИ
БЕЧЕЈ
Ударничка бр. 40
Тел/факс: 021/817-274

**У "НЕКТАРУ"
ВАС ОЧЕКУЈЕ:**

- израда и продаја сатних оскова
- замена и откуп воска
- пчеларски прибор и опрема
- кошнице
- погаче за прихрану пчела
- баగремов, липов, ливадски и
- сунцокрстов мед
- за борбу против варој - обратите
- нам се

 NEKTAR
БЕЧЕЈ, тел: 021 / 81 - 274



КВАЛИТЕТНЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ИСПИТАНЕ САТНЕ ОСНОВЕ
Достављамо на адресу - БЕСПЛАТНО!

9. ПЧЕЛАРЕЊЕ СА ТРИ ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА


Све је виш пчелара који су проценили да се без изузетно јаких пчелињих друштава не могу остварити високи приноси меда у главној паши и с тим у вези до главне паше пчеларе са три пчелиња друштва, а у главној паши користе пчеле сабирачице из два друштва за појачавање трећег производног друштвата.

Постоје различити поступци пчеларења са три друштва. У овој књизи ће бити описано:

- Пчеларење са три једноматична друштва током целе године и коришћење налета пчела из два друштва за појачавање трећег производног друштвата у главној пати,
- Пчеларење са двојним друштвом и једноматичним друштвом до главне паше, а у главној паши формирање јаког двојног друштвата,
- Пчеларење током целе године са три друштва под истим кровом, а у главној паши формирање јаког двојног друштва, или једноматичног друштва.


9.1. Пчеларење са три једноматична друштва током целе године и коришћење налета пчела два друштва за појачавање трећег производног друштва у главној паши

Пчелиња друштва се зазиме у групама од по три друштва. Сва три друштва (A, B и C) треба да су подједнаке јачине (слика 9.1.).




Слика 9.1. Три пчелиња друштва испре или сличне јачине зазимљена у групи

У току пролећног развоја свако друштво се развија посебно са циљем да свако од њих достigne максимални развој за главну пашу, сагласно технологији пролећног развоја пчелињих друштава (одељак 2.4.).



Слика 9.2. Стапање ћелињих друштава на око 15 дана пре багремову пашу, пре припреме за ову пашу

На око 15 дана до главне паше, пре припреме за главну пашу, сва три друштва треба да су исте или сличне јачине (слика 9.2.).



Слика 9.3. Појачавање производног друштава (Б) налеђом ћела из осипала два друштва у групи (А и В)

У оквиру припреме за багремову пашу (око 25. априла) могуће је поступити на више начина:

- може се из једног друштва, нпр. из друштва (В), појачати затвореним лестлом друштво (А) и (Б), или само друштво (Б), које ће бити производно друштво, тако што се у плодишту где је матица у друштву (Б) и (В) преуреди гнездо у складу са поступком наведеним у одељку 2.5.1.,
- може се у сва три друштва (А, Б и В) средити плодиште као у одељку 2.5.1., а кад крене главна паша, склони се у страну друштво (А) и (В),


да би њихове сабирачице, налетом пчела ушле у друштво (Б) и тиме га додатно ојачале за главну пашу (слика 9.3.).

Практично, принцип рада са наведена три друштва до главне папе и после главне паše, сличан је претходно описаном методу пчеларења са два друштва током целе године и коришћењем налета пчела једног друштва у главној папи за појачавање другог (производног) друштва. Разлика је само у томе што се у овом случају користи налет пчела из два друштва за појачавање једног (производног) друштва у главној папи.

9.2. Пчеларење двојним и једноматичним друштвом до главне паše, а у главној паши формирањем јаког двојног друштва


Зазими се на пчелињаку у групама по једно двојно (А и Б) и једно једноматично (В) друштво (слика 9.4.). У току пролећа друштва се развијају на већ описани начин (поглавље 2. и 7.).

Ако се у главној (багремовој) паши пчелари стационарно, кад багрем замеди, склони се једноматично друштво лево, или десно од двојног друштва да све сабирачице из једноматичног друштва, налетом пчела, уђу у двојно друштво, а двојном друштву се дода потребан број медишта, и усменре пчеле из горњег друштва у доње, манипулацијом дуплих лета (слика 9.5).




Слика 9.4. Двојно и једноматично друштво зазимљено једно поред другог


Ако се пчелиња друштва селе на главну папу, двојно друштво се прстенодно споји у јако једноматично друштво, уз формирање једног нуклеуса (слика 9.6.).



Слика 9.5. Појачавање двојног друштава сабирачицама из једноматичног друштава налеђом ћела



Слика 9.6. Сијање ћелињег друштава испред сеобу на главну пашу




Слика 9.7. Сијање досељених ћелињих друштава на главну пашу

На локацији главне паше друштва се поставе као на слици 9.7., а затим се среди као на слици 9.8., када се истовремено усмере пчеле сабирачице из горњег друштва у доње друштво манипулацијом лета на подној дасци са дуплим летима (одељак 7.).

Овако јако двојно друштво оствариће велике приносе меда.

После багремове паше поступак пчеларења је исти као што је описано у одељку 7. (двојно пчеларење).




Слика 9.8. Пчелиња друштава у главној паши


9.3. Пчеларење са три друштва током целе године под истим кровом, а у главној паши формирање јаког двојног друштва спајањем

Ефикасно се може пчеларити са три друштва под истим кровом током целе године на следећи начин:

- пчелиња друштва (А, Б и В) се зазиме као што је приказано на слици 9.9. или 9.10.



Слика 9.9. Тројно друштво формирано у току августа




Слика 9.10. Припрема за проматично пчеларење у току зиме

У току предпролесног и пролесног развоја пчелињих друштава поступа се на сличан начин као код двојног пчеларења (поглавље 7.).

Непосредно пред багремову пашу склони се у нуклеус једна матица (по правилу старија), са 1-2 рама легла и меда, и друштво се прсуреши у двојно друштво, са потребним бројем медишта, као што је приказано на слици 9.11.

После багремове паши могуће су различите варијантне пчеларења:

- може се и даље наставити са двојним пчеларењем,
- може се наставити двоматичним пчеларењем, може се двојно друштво свести на једноматично, уз разрођавање по Пелетовом систему, итд.



Слика 9.11. Двојно друштво настапало од тројнога у багремовој паши

PROIZVODI
EVROTOM
PROGRAM ZA PČELARSTVO

RUMA, Kraljevska 46
Tel.: 022/429-569,
Fax: 421-675



VAROTOM®

Уништава и до 99 %
варој.

FURMITOM®

Уништава варој у затвореном леглу.
пчелињу ваш. воштаног мольца, узро-
чника акарозе и дезинфекције кошнице.

ASKOTOM®

Спречава појаву кречног легла

FUMAGELLIN-ET®

Спречава развој ноземозе.

APITOL®

Системик, уништава и до
99% варој.

**IA ZA
'ANU
DM®**

на у периодима го-
родне паше, у рано
о прихранивање и
од глади и угинућа.

Е ПОГАЧЕ

СЕЗЕМ®
мозу пчела.

EST®

ију америчке
важи
пе.

ВИТАМИНИ,

МИНЕРАЛИ...

FORSSATOM®

Матици подстичив на поплагање јеје,
пчевљ успешније негују легло, брже
обивљају друштво, повећава се
отпорност пчела према болестима,
пчеле боље зимују...

СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ САЋА

Штити изврдано саће у складишту од
мольца, дезинфекције кошнице...

МАМАЦ ЗА РОЈЕВЕ
FERMONSKI MAMAC

успешно привлачи и
хвата
ројеви.

PROIZVODI
EVROTOM

PROGRAM ZA PČELARSTVO

**ПОГАЧА ЗА
ПРЕХРАНУ**
APITOM®

Прихранивање пчела у периодима го-
дине када нема природне паше, у рано
пролеће подстицајно прихранивање и
зими ради спасавања од глади и угинућа.

ЛЕКОВИТЕ ПОГАЧЕ

APINOZEM®

Сузбијв ноземозу пчела.

APIPEST®

Спречава појаву америчке
трулежи
легла.

**ПОГА
ПРЕХ
API1**

Прихранивање пч-
дине када нема пр-
праље подстицај
зими ради спасава-
ња

ЛЕКОВИ

APIN

Сузбијв ноз

APIF

Спречава по
тру-
ле

ПРОДАЈА:

- опрема и прибора
за пчеларство
- пчеларске литературе
- пчелињих производа
- сатних основа
и земена воска

ФИЛМ
БОЛЕСТИ ПЧЕЛА
И ЛЕЧЕЊЕ



Tel.: 022/429-569 22400 RUMA
Fax: 022/421-675 Kraljevska 46

10. ЛИТЕРАТУРА

1. Божидар Весковић: Практично пчеларство, са радовима по месецима, Београд, 1997.
2. Божидар Весковић: На пчелињаку, радови по месецима и кратке пчеларске поруке, Београд, 1995.
3. Божидар Весковић: Високи приноси меда, Београд, 1984.
4. Божидар Весковић: Основна правила при гајењу пчела, Београд, 1991.
5. Божидар Весковић, Др Славомир Поповић: Високи приноси меда и производне способности пчела, Београд, 1993.
6. Тихомир Јевтић: Живот и гајење пчела, Београд, 1974.
7. Тихомир Јевтић: Рад са великим бројем кошница, Београд, 1966.
8. Др Богољуб Константиновић: Практично пчеларство, Београд, 1976.
9. Проф. Др Богољуб Константиновић: Практично пчеларство, наука и пракса за праксу, Београд, 1996.
10. Јован Кулинчевић, Гачић Рајица: Пчеларство, Београд, 1984.
11. Др Јован Кулинчевић, Рајица Гачић: Пчеларство, Београд, 1991.
12. Проф. Др Јован Кулинчевић: Пчеларство, наука и пракса, Београд, 1997.
13. Војин Тодоровић: У пчелињаку током године, Београд, 1980.
14. Војин Тодоровић, Душан Тодоровић: Практично пчеларство, Београд, 1985.
15. Војин Тодоровић, Др Душан Тодоровић: Практично пчеларство, Београд, 1990.
16. Др Славомир Поповић, Анта Антић: Пчеларење за почетнике, Београд, 1991.
17. Мића Младеновић, Славомир Поповић и др.: Увод у пчеларство, Београд, 1993.
18. Божидар Весковић, Славко Јаковљевић и др.: Узимљавање и про-лећни развој друштава, Београд, 1994.
19. Др Славомир Поповић, Божа Петровић: Технологија пчеларења у току године, Београд, 1994.
20. Божа Петровић, Славомир Поповић: Узгој матица, Београд, 1995.
21. Др Славомир Поповић: Пчеларење за почетнике, друго изменено издање, Београд, 1995.
22. Славомир Поповић: Планирано умножавање пчелињих друштава, Београд, 1996.

23. Божа Петровић, Славомир Поповић: Технологија пчеларења са вишематица и високи приноси меда, Београд, 1996.
24. Славомир Поповић: Лангстрот-Рутова и Даади-Блатова кошница - опрема и прибор, Београд, 1997.
25. Бранко Релић: Пчеларство и економика пчеларења, Сремска Митровица, 1988.
26. Бранко Релић: Пчеларење као професија и хоби, Београд, 1995.
27. Проф. Др Јоже Рихар: Пчеларење настављачама, Љубљана, 1981.
28. Ј.Белчић и др.: Пчеларство, Сарајево, 1982.
29. Жарко Симин: Правна заштита пчела, Београд, 1988.
30. Др Дуллан Тодоровић: Болести, тровање и штеточине пчела, Београд, 1989.
31. Мирослава Лолин: Болести пчела, Београд, 1991.
32. Славко Јаковљевић: Радови на пчелињаку, Београд, 1997.
33. Зоран Милановић: Пчеларство - збирка података, Београд, 1997.
34. Бранислав Буричић, Рајко Пејановић: Технологија пчеларења, Београд, 1996.
35. Борђије Ђорђевић: Пчеларство, Приштина, 1994.
36. Милько Шљивић: Изабране теме из технологије пчеларења, Крушевац, 1997.
37. Технологија пчеларења, Зборник радова, друго саветовање, Друштво пчелара Београд, 1995.
38. Технологија пчеларења, Зборник радова, треће саветовање, Друштво пчелара Београд, 1996.
39. Милан Матић: Усмеравање рада пчела, Шабац, 1996.
40. Божа Петровић: Мој начин пчеларења, Београд, 1993.
41. Иван Венер: Моја комбинована метода пчеларења са ЛР-кошницом, Београд, 1995.
42. И.Е.Кривчанскиј, В.Н.Идричани: Љубитељскоје пчеловодство, Кишинев, 1987.
43. Г.Д.Билаш и др.: Пчеловодство, Маљенкаја енциклопедија, Москва, 1991.
44. Пчеларска енциклопедија, Софија, 1991.
45. Миленко Радосавовић: Пчеларство за почетнике и градња кошница, Београд, 1989.
46. Зборник радова, 10. конгрес пчелара Југославије, Крагујевац, 1997.
47. Зборник научних и стручних радова, 17. републичко саветовање из сточарства и пчеларства, Польопривреда, Бања Ковиљача, 1996.
48. "Пчеловодство", Москва, 1990-1998.
49. "Пчелар", Београд, 1990-1998.

